

Cuadró sinóptico de DM tipo 2

Nombre del alumno:

Diana Roció Gómez López .

Nombre del profesor:

Dr. Jesús Eduardo Cruz Domínguez

Parcial: 1 er. Parcial.

Semestre: 6to Semestre. 5to D

Nombre de la Materia:

Geriatría

Diabetes II

DEFINICIÓN

Perdida progresiva de la secreción de la insulina de cel. B x la resistencia a insulina.

EPIDEMIOLOGIA

Segunda causa de muerte en Mexico Adultos

FACTOR RIESGO

>40 años edad
TENER sobrepeso, Obesidad abdominal
Sedentariismo
AFamiliares, AGeneracional
MEXICANO
Alcoholico

MANIFESTACION CLINICA

ESPECIFICOS

Polidipsia
Poliuria
Pérdida de peso
Ponuria

INESPECIFICOS

Fatiga
Irritabilidad
Anorexia
↓ Peso

DIAGNOSTICO

Glucosa en ayuno >126
Hemoglobina glicosilada valores mg/dl
Glucosa plasmática >200
hiperglicemia y glicemia >200 >6.5%

TX NO FARMACOLOGICO

CAMBIO ESTILO de vida - ejercicio
Dieta mediterranea
valorar salud bucal

TX FARMACOLOGICO

1era linea - METFORMINA
2da linea - SITAGLIPINA, vidagliptina
otros - ISGLT2 = Dapaglifozina

EUITAR

sulfonilureas - HIPOGLUCEMIA