



Nombre del alumno: Carlos Ulises Gordillo Cancino

6to Semestre, Grupo **D**

Docente: Dr. Raul de la Rosa Pacheco

Materia: Neurología

11 de Abril del 2025

CUADRO COMPARATIVO

NEUROLOGÍA

CEFALEAS	DEFINICIÓN	CARACTERÍSTICAS	SINTOMAS ASOCIADOS	EPIDEMIOLOGIA	DURACION	INTENSIDAD	DX	TX
CEFALEA TENSIONAL	DOLOR DE CABEZA QUE SE SIENTE COMO UNA PRESIÓN O BANDA APRETADA ALREDEDOR DE LA CABEZA	SE SIENTE COMO UNA PRESIÓN O OPRESIÓN EN LA CABEZA	- Dolor de cabeza sordo y persistente - Sensación de opresión o tensión en la cabeza - Dolor que se siente como una banda apretada alrededor de la cabeza - Sensibilidad en el cuero cabelludo, el cuello y los hombros	En México, entre el 60 y 80% de la población padece cefaleas tensionales, que son el tipo de dolor de cabeza más frecuente	DESDE 30 MINUTOS HASTA UNA SEMANA	Leve o moderada	SE BASA EN LOS SÍNTOMAS Y EN UN EXAMEN FÍSICO, INCLUYENDO UN EXAMEN NEUROLÓGICO (G442)	AINES (IBUPROFENO, LA ASPIRINA O EL PARACETAMOL)
MIGRAÑA	DOLOR DE CABEZA RECURRENTE QUE PUEDE SER INTENSO Y PULSÁTIL	- SER ACOMPAÑADO DE NÁUSEAS, VÓMITOS, Y SENSIBILIDAD A LA LUZ Y AL RUIDO - EMPEORAR CON EL EJERCICIO - TENER UNA DURACIÓN VARIABLE ENTRE POCAS HORAS HASTA VARIOS DÍAS	- Hipersensibilidad a los olores - Malestar ante la luz y el ruido - Destellos de luz - Puntos ciegos - Otros cambios en la visión - Hormigueo en la mano o la cara	En México, el 15% de la población padece migraña, una enfermedad que afecta la calidad de vida de las personas	UNA MIGRAÑA PUEDE DURAR DE 4 A 72 HORAS SI NO SE TRATA	MODERADA A SEVERA	- RESONANCIA MAGNÉTICA - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA	- PARA LOS ATAQUES AGUDOS, TRIPTANOS, LASMIDITAN, GEPANTES O DIPHENOCETAMINA - ANTAGONISTA DE LA DOPAMINA - DISPOSITIVOS NEUROMODULADORES PARA EL TRATAMIENTO AGUDO Y LA PREVENCIÓN
CEFALEAS EN RACIMOS	DOLOR DE CABEZA INTENSO QUE SE PRESENTA EN EPISODIOS FRECUENTES, CONOCIDOS COMO RACIMOS.	- DOLOR PUNZANTE - LAGRIMO, ENROJECIMIENTO Y/O GOTEEO NASAL EN EL LADO DEL DOLOR - PÁRPADO CAÍDO - CONTRACCIÓN ANORMAL DE LA PUPILA - EDEMA DE PÁRPADO	Dolor de cabeza intenso, lagrimeo, congestión nasal, enrojecimiento de los ojos, y cambios en la pupila	- La cefalea en racimos afecta al 0,1% de la población. - Es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación de 6:1.	PUEDE DURAR DE 15 MINUTOS A 3 HORAS, AUNQUE LO MÁS COMÚN ES QUE DURE DE 30 A 45 MINUTOS	- Dolor intenso - Puede ser agudo - Puede ser punzante	- RESONANCIA MAGNÉTICA - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA	- PARA ABORTAR LOS ATAQUES, TRIPTANOS, DIPHENOCETAMINA, PARACETAMOL O ASPIRINA - PARA LA PROFILAXIS A LARGO PLAZO DE LA FORMA EN SACIO ERIGIDA, VERAPAMIL, LITIO, TOPIRAMATO, DIVALPROSATO O UNA COMBINACIÓN DE ELLOS, O GALECANEZUMAB.