

VACUNAS.

Nombre del alumno:
Katia Marlen Espinosa Sanchez.

Nombre del profesor:
Dra. Karla Sofía Gutiérrez.

Parcial: 2do parcial.

6to. semestre / 6to. D.

Materia: Pediatría.

Vacuna.	Triple viral SRP	DPT	Hep A.
Dosis	0.5 ml	0.5 ml	0.5 ml
E. adversos	Fiebre cefalea Rash. porpura.	Fiebre y síntomas locales.	
Contra- indicaciones	Fiebre $>38^{\circ}$ TB s/Tx Enf. neurológica	Anafilaxia Crisis convulsivas.	
Vía de Adm.	Subcutánea	Intramuscular.	Subcutánea
Edad.	12 meses. 18 meses 6 años	6 semanas 10 semanas 14 semanas.	12 meses

Vacuna	BCG	Hep B	Hexavalente Acelular.
Dosis	0.1ml	0.5ml	0.5 ml
Via de Adm.	Intradérmica.	Intra - muscular.	Intramuscular.
Edad.	Nacimiento	1ros 7 días de vida. 2 meses. 6 meses.	2 meses. 4 meses. 6 meses.
Contra - indicaciones.	SIDA Leucemia Neoplasia . Inmuno - deficiencia.	Fiebre >38.5 Hipersensibilidad.	
Efectos adversos.	Pápula que se ulceray cicatriza .	Fiebre Fatiga Síntomas gastro - intestinales.	

Vacuna	Antiwo- tavirus	Neumococca conjugada.	Antiinfluenza.
Dosis	1.5 ml	0.5 ml	0.5 ml
Efectos Adversos	Fiebre. Irritabilidad síntomas gastrointesti- nales.	Eritema. Dolor. Fiebre. Irritabilidad.	Fiebre y mialgia.
Contraindi- caciones	Alergia al latex. Malforma- ciones congénitas.	Fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$ Hipersensibilidad.	Alergia al huevo. Fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$
Via de Adm.	Oral.	Intramuscular.	Intramuscular.
Edad.	2 meses. 4 meses. 6 meses.	2 meses. 4 meses. 12 meses.	6 meses Refuerzo anual.

Vacuna .	Varicela .	VPH .
Dosis	0.5 ml	0.5 ml
E: Adversos		
Contraindicaciones .		
Vía de Adm .	Subcutánea .	Intramuscular
Edad .	12 meses y 13 años .	Niños que cursan en 5to ° Primaria .