



Nombre del alumno: Zenaida Saragos Jiménez.

Nombre del tema: Esquema de Vacunación.

Parcial: 2.

Nombre de la materia: Pediatría.

Nombre del profesor: Dra. Karla Sofía López Gutiérrez.

Medicina Humana.

6to semestre.

Comitán de Domínguez Chiapas 12 de abril 2025.

Vacuna	Dosis	Aplicación	Edad	Efectos Adversos	Contraindicaciones
BCE (Levita Tb Meningea).	0.1 ml	Intradermica	Nacimiento	Papula que se cae a los 40-45% y coque Escatise	Si DA, Tx Inmuno, Supresores, leucemia, neoplasia o inmunodeficiencia.
Hepatitis B	0.5 ml	Intramuscular	primeros 7 días de vida - 2 meses - 6 meses	Fiebre, Fatiga y Síntomas gastro-intestinales	Fiebre $> 38.5^{\circ}$, hipersensibilidad.
Hexavalente acelular. (Dift, tos, tetan, etc.)	0.5	Intramuscular	2 meses, 4 meses, 6 meses.		
Antirrotavirus	1.5 ml	Oral	2 meses, 4 meses y 6 meses.	Síntomas gastro-intestinales, Fiebre, Cefalea de la cabeza, Irritabilidad.	alergia al latex, con- malformaciones congénitas no corregidas del tracto GI.
Neumococo Conjugado	0.5 ml	Intramuscular	2 meses, 4 meses y 12 meses	Eritema, dolor, Infección, fiebre e irritabilidad.	Fiebre $> 38.5^{\circ}$, hipersensibilidad.
Antiinfluenza	0.5	Intramuscular	6 meses y refuerzo anual	Fiebre y Mialgia.	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna previa y fiebre $> 38.5^{\circ}\text{C}$
Triple viral SAP	0.5	Subcutanea	12 meses, 18 meses y 6 años	Fiebre, Rash, cefalea, leuc, parotiditis, meningitis, Purpura	Inmunodeficiencia, fiebre $> 38.5^{\circ}$, enf. neurológica, TB. Transfusión o que reciban IG.
DPT	0.5 ml	Intramuscular	6 semanas, 10 semanas y 14 semanas.	Fiebre y síntomas locales.	Anafilaxia, encefalopatía, enf. neurológica progresiva y crisis convulsivas.
Hepatitis A	0.5 ml	Subcutanea	12 meses 12 meses > 13 años		
VARICEPA	0.5 ml	Subcutanea	Niños en	Síntomas GI y locales	No vacunarse < 4 años, gestación, fiebre.
VPH	0.5 ml	Intramuscular	5to de Primaria.		