

Nombre	Dosis	Vía	Edad Aplicación	Contraindicaciones	Efectos adversos
BCG	0.1ml	• Intradermica	• Nacimiento	- Neoplasias - Leucemia - SIDA - Inmunodeficiencia - Tx inmunosupresor	• Papula que se ulcera y causa cicatriz → 90%
Hexavalente celular	0.5ml	• Intra-muscular	• A los 2 meses y 18 meses	- Encefalopatías	• Hinchazón
Antitetanus	1.5ml	• Oral	• A los 4 meses	- Desorden neurológico - Alergia al latex - Maternaciones congénitas	• Dolor
Neumococo Conjugada	0.5ml	• Intra-muscular	• 2 meses • 4 meses • 12 meses	- Fiebre > 38.5° - Hipersensibilidad	• Síntomas gastrointestinales • Fiebre • Irritabilidad
Hepatitis B	0.5ml	• Intra-muscular	• Nacimiento	- Fiebre > 38.5° - Hipersensibilidad - Alergia al huevo - Guillain Barre - Fiebre > 38.5°	• Fiebre • Irritabilidad • Fiebre y fatiga
Antiinfluenza	0.5ml	• Intra-muscular	• 6 meses	- Inmunodeficiencia - Fiebre > 38.5° - Enf. Neurológicas - TB - Anafilaxia - Encefalopatía - Crisis convulsivas	• Fiebre y mialgia • Fiebre • Rash • Cefalea • Parotiditis
Triple viral SRP	0.5ml	• Subcutanea	• 12 meses • 6 años	- Alergias al huevo	• Fiebre y Sx locales
DPT	0.5ml	• Intramuscular	• 48 meses • 6 meses • 7 meses • 2 años • 4 años	- Alergias al huevo - Inmunodeficiencias - Guillain-Barre	• Dolor • Fatiga • Cefalea • Fiebre
Influenza	0.5ml	• Intramuscular			