



Universidad del sureste
Campus Comitán
Licenciatura en Medicina Humana



Cuadro comparativo de ictericia

Nombre del alumno: Jennifer González Santiz
Materia: Pediatría
Grado y grupo: 6° D
Nombre del docente: Karla Sofía Gutiérrez López

Nombre	Fisiología	Lactancia materna	Incompatibilidad ABO	Incompatibilidad Rh
Causa	Aumento de la bilirrubina indirecta	Baja ingesta calórica LM inhibe el ácido glucoronico	Madre o RN: A, B, AB	Formación de anticuerpos C, D y E + frecuente D 90%
Día de aparición	2 a 3 días	4 a 7 días Hasta 3 a 12 semanas	Primeras 24 horas	Primeras 24 hrs
Síntomas	Cambio de coloración de la piel No hidrops	Cambios de coloración en la piel	Ictericia leve (puede agravarse) No hidrops	Anemia fetal grave Hidrops Hiperbilirrubenia severa
Tratamiento	Baños de sol Fototerapia > 14mg	Fototerapia 460nm Luz azul especitubos fluorescentes Protección solar Baños de sol <10 mg	Fototerapia	Profilaxis - Gamaglobulina anti-D 100mg en 1º embarazo - Dosis adicional 48-72 hrs postparto, aborto y amniocentesis Postnatal - Fototerapia - Exanguinotransfucion