



*Nombre del alumno: Sonia Araceli Huacash Méndez*

*Nombre del tema: VACUNACION*

*Parcial 2*

*Nombre de la Materia: PEDIATRIA*

*Nombre del profesor: Dra. Karla Sofia López Gutiérrez*

*Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana*

Vacuna	Dosis	Efectos adversos	Contraindicaciones	Edad	Via
BCG	0.1 ml	papula que se ulcera y causa cicatriz	SIDA, Tx inmunosupresor, Leucemia, neoplasias o inmunodeficiencias.	Al nacer	Intradermica cara externa del brazo no dominante.
Hepatitis B	0.5 ml	Fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinales.	Fiebre >38.5°, hipersensibilidad	Al nacer, 2 meses y 6 meses.	IM Brazo derecho
Hexavalente acelular (dift., tsof., tetan., polio, hep B y H. Influenzae B)	0.5			2 meses 4 meses 6 meses 18 meses.	IM <18 meses: muslo derecho >18 meses: brazo izquierdo.
Antirrotavirus	1.5 ml	Síntomas gastrointestinales, fiebre, irritabilidad	Alergia al latex, antecedente de Intususcepción, malformaciones congénitas, no corregida, de tracto GI	2 meses 4 meses 6 meses	Oral.
Neumococia conjugada	0.5 ml	Eritema, dolor, indoración, Fiebre e irritabilidad.	Fiebre >38.5°, hipersensibilidad	2 meses 4 meses 12 meses	IM
Antiinfluenza	0.5 ml	Fiebre y Mialgia	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna previa y Fiebre >38.5°	6 meses 7 meses Anual hasta los 54 meses.	IM <18m = muslo derecho >18: brazo izquierdo
SRP Triple viral	0.5 ml	Fiebre, rash, cefalea, parotiditis, meningitis, porpora	Inmunodeficiencias, Fiebre >38.5°, enf. neurológica, TB, SIDA, transfusión que reciban 16 esperar 3-11 me.	1 año 6 años.	Subcutanea en 1/3 superior del brazo

Vacuna	Dosis	Efectos adversos	Contraindicaciones	Edad	Via
DPT	0.5 ml	Fiebre y síntomas locales	Anafilaxia, encefalopatía, enf. neurológica progresiva, crisis convulsivas.	Refuerzo 4 años	IM Brazo izq.
Hepatitis A	0.5 ml	Fiebre baja, cefalea, cansancio, pérdida de apetito, dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección.	Dolor, eritema, hinchazón, induración. Alergia	12 meses en niños q' asisten en guardería 1-8 años	IM < 18 m muslo izq. > 18 m brazo izquierdo
Varicela	0.5 ml	Dolor, hinchazón, enrojecimiento, fiebre rigidez articular	Reacción alérgica, inmunodeficiencia Embarazo, inmunocompetente,	① = 12 meses de edad ② = entre 4 y 6 meses > 13 a inicio de esquema en intervalo de 4 sema.	Subcutáneo brazo izquierdo.
VPH	0.5 ml	Síntomas GI y locales.	NO vacunar a < 9 años inmunodeficiencia, fiebre, gestación e hipersensibilidad.	niños de 5 to de primaria. - intervalo de 1-2 y 6 meses = mujeres y hombres, entre 11-49 años que viven con VIH.	IM en brazo no dominante.