



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Karen Lizeth Nájera Carpio

Nombre del tema: Clasificación de ictericia neonatal

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Pediatría

Nombre del profesor: Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Lugar y Fecha de elaboración: Comitán de Domínguez Chiapas.

26/05/2024

Nombre:	Fisiológica		Lactancia M.	Incompatibilidad	
Tipo	Hiperbilirrubinemia no conjugada No hay buena adaptación, eritrocito		Hiperbilirrubinemia no conjugada	AR+H	ABO
Causa	Inmadurez del hígado, más ↑ degradación de globulos rojos		El aumento de bilirrubina	Formación de antígenos "C,D,E"	Se crean anticuerpos naturales 1º embarazo
Síntomas	Coloración de color amarillo de la piel y mucosas		Coloración amarillenta de la piel y de las mucosas.	La más grave, anemia fetal grave	Coloración amarillenta en piel y mucosas
Día de aparición	2-3 días después del nacimiento		4-7 días	Primeras 24 horas	
Tratamiento	Sin Tx, se resuelve en 1 semana		Fototerapia	- Postnatal: directo/Hb/bilirrubina/albúmina. Fototerapia	