




Mi Universidad

Nombre del Alumno: Débora Mishel Trujillo Liévano

Nombre del tema: hormonas placentarias

Parcial: 2

Nombre de la Materia: ginecología

Nombre del profesor: Arely Guadalupe Aguilar Velazco

Nombre de la Licenciatura: medicina humana

Cuatrimestre: 6

Fecha de elaboración: 10 de abril del 2025

Vacuna	Dosis	Efectos adversos	Contra indicaciones	Edad	Via
BCG (Evita Tb meníngea)	0.1ml	Pápula que se ulcera y causa cicatriz (90-95%)	SIDA, tx inmunosupresor, Leucemia, neoplasias o inmunodeficiencia	Al nacimiento	intradérmica
Hep B	0.5ml	Fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinales	Fiebre mayor de 38.5, hipersensibilidad	Al nacimiento, Apartir de los 11 años de edad en personas sin antecedente vacunal	subcutánea
Hexa Valente acelular (dift, tosfe, Tetan, polio, hep b y H.influenzae tipo B)	0.5ml	No tiene	No tiene	2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses,	intramuscular
Antirrotavirus	1.5ml	Síntomas gastrointestinales, fiebre, irritabilidad	Alergia al latex, antecedentes de intususcepción, malformaciones congénitas no corregidas de tracto GI	2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses	oral
Neumococica conjugada	0.5ml	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad	Fiebre mayor de 35 grados, hipersensibilidad	2 meses, 4 meses, 12 meses	intramuscular
antiinfluenza	0.5ml	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain barre por vacuna previa y fiebre mayor de 35 grados Celsius.	Población de 10-59 años con factor de riesgo. Población de 60 años Embarazadas en cualquier trimestre del embarazo.	intramuscular
Triple viral	0.5ml	Fiebre, rash,	Inmunodeficiencia,	12 meses y 6	Subcutánea

		cefalea, parotiditis, meningitis, purpura	Fiebre mayor de 38, enf. Neurológicas, tb, s/tx, transfusión o que resiben IG esperar 3-11 meses	años	
DPT	0.5ml	Fiebre y síntomas locales	Anafilaxia, encefalopatía, enf.Neurológica progresiva, crisis convulsivas	A los 4 años de edad	intramuscular
Hepatitis A	0.5ml	No hay	No hay	2 dosis por lo menos en un intervalo de 6 meses	Intramuscular
varicela	0.5ml	No hay	No hay	Se aplica a partir de 12 meses de edad y la segunda entre 4 y 6 meses	Subcutánea
VPH	0.5ml	Síntomas GI y locales	No vacunar a menores de 9 años de edad, inmunodeficiencia, fiebre, gestación, e hipersensibilidad	3 dosis con intervalo de 1-2-6 meses, mujeres y hombres entre 11- 49 años que viven con VIH	Intramuscular