



Nombre del alumno: Carlos Ulises Gordillo Cancino

6to Semestre, Grupo D

Docente: Dra. Karla Sofía Guitierrez López

Materia: PEDIATRÍA

01 de Julio de 2025



Carlos Ulises
Gordillo Cancino

PEDIATRIA

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

	EPIDEMIOLOGIA	ETIOLOGIA	CLASIFICACION	CLINICA	DX	TX
RESFRIADO COMUN	INCIDENCIA EN OTOÑO Y PRIMAVERA	VIRAL	PRINCIPALMENTE LA NARIZ Y LA GARGANTA	• CONGESTION NASAL • FIEBRE • TOS • DISFONIA • ODINOFAGIA	COMBINACIÓN DE LOS SIGUIENTES SIGNOS Y SÍNTOMAS: -CONGESTIÓN NASAL. -FIEBRE. - ODINOFAGIA -TOS -DISFONIA	• PARACETAMOL (10 MG/KG PESO) (MEDICAMENTO DE ELECCION).
FARINGOAMIGDALITIS	INCIDENCIA DE FARINGITIS DE 107.14 POR CADA 100 MIL HABITANTES.	VIRAL • RINOVIRUS • ADENOVIRUS • CORONAVIRUS 15% STREPTOCOCCUS PYOGENES	• ERITEMATOSA S • ERITEMATOPULTACEA S.	• AUSENCIA DE TOS • FIEBRE A 38° C • ADENOPATIAS	• CLINICO • CRITERIO DE CENTOR (MENOS DE 2 PTS: TX SINTOMATICO) • 3 PTS (PRUEBA RAPIDA DE ANTIGENO SBHGA).	NIÑOS MENORES DE 27 KG • PENICILINA Y BENZATINICA (600 000 UI IM DU) MAYORES DE 27 KG • PGB 1.200.000 IM DU
TOS FERINA	MAS FRECUENTE EN INVIERNO • 6 MESES - 3 AÑOS • MAYORES DE 20 AÑOS	BORDETELLA PERTUSSIS	CATARRAL, PAROXISTICA Y DE CONVALECENCIA	• FASE CATARRAL • FASE PAROXISTICA • FASE CONVALENCIA	• CLÍNICO • LABS: LINFOCITOSIS • GS: CULTIVO NASOFARINGEO	• FC: ERITROMICINA POR 14 DIAS + VACUNA HEXAVALENTE • PROFILAXIS: ERITROMICINA POR 14 DIAS • VACUNA TDPa
BRONQUIOLITIS	INFECCIÓN RESPIRATORIA COMÚN EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS, ESPECIALMENTE ENTRE LOS 2 Y 6 MESES DE EDAD	VIRAL	SE BASA EN SI LOS BRONQUIOLOS SON UN COMPONENTE PRIMARIO O SECUNDARIO DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS PATRONES HISTOPATOLÓGICOS.	DÍA 1-3: FEBRÍCULA + RINORREA + TOS • DÍA 4-6: TAQUIPNEA, HIPOXIA, SIBILANCIAS AUDIBLES (EDEMA + MOCO), CIANOSIS. • EF. PROLONGACIÓN DE FASE ESPIRATORIA.	CLINICO RX TORAX	NEBULIZACIÓN CON NACL AL 3% (HIPERTÓNICA) • O ₂ : CUANDO TENGA SATURACIÓN < 90%
ASMA	EL ASMA AFECTA A 262 MILLONES DE PERSONAS A NIVEL MUNDIAL	SE DEBE A LA INFLAMACIÓN Y LA CONTRACCIÓN DE LOS MÚSCULOS QUE RODEAN LAS VÍAS RESPIRATORIAS	INTERMITENTE LEVE, MODERADA, GRAVE INTERMITENTE	TOS, DIANEA, OPRESION TORACICA	ESPIROMETRIA RX	SCATE: SALBUTAMOL > 12 AÑOS: FORMOTEROL + CEI (BUDESONIDA) -PASO 2: CORTICOSTEROIDES INHALADOS DOSIS BAJAS (CEI) -PASO 3: CEI DOSIS BAJA + LABA O CEI DOSIS MEDIA