



Universidad del sureste
Licenciatura en Medicina Humana
Campus Comitán



Esquema de vacunacion

Nombre del alumno: Jennifer Gonzalez Santiz

Materia: Pediatria

Grado y grupo: 6to semestre "D"

Nombre del docente: Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Vacuna	Dosis	Efectos adversos	Contraindicaciones	Edad	Vía y zona
BCG (Eritr TB meningea)	0.1 ml	Reapela que se ulcera y causa costra (90-95%)	SIDA, tx inmunosupresor, leucemia, neoplasia circunferencia	Nacimiento	Vía intradérmica en la región superior de la inserción distal del musculo deltoides
Hepatitis B	0.5ml	Fiebre, fatiga síntomas gastrointestinales	Fiebre > 85.5°C Impermeabilidad	14 años en personas sin antecedentes vacunal < 18 meses	Vía intramuscular • Muslo (7q) (< 18 meses). • Brazo
Hexavalente celular	0.5 ml			2, 4, 6 y 12 meses	Vía intramuscular • < 18 meses muslo derecho • Brazo izquierdo > 18
Anthrax	1.5ml	Síntomas gastrointestinales, fiebre irritabilidad	Alergia al latex, antecedentes de infección malformaciones congénitas no corregidas de tracto GI	2 y 4 meses	Vía oral Engaños, dentro de la mejilla
Neumococica conjugada	0.5ml	Eritema, dolor, induración, fiebre e irritabilidad	Fiebre > 38.5°C Impermeabilidad	6 semanas, 12 meses y una de refuerzo > 60 años	Vía intramuscular Cara anterolateral del muslo ventral O el muslo deltoideo Personas mayores en el brazo
Anthrax Fluencia	0.5ml	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain y Barre por vacuna previa y fiebre > 38°C	6 meses a 35 meses Niños, adolescentes y adultos	Vía intramuscular < 18 meses muslo anterolateral > 18 meses y adultos muslo deltoides o brazo
Tríp. ura RP	0.5 ml	Fiebre, rash, cefalea, parotiditis, meningitis, purpura	Inmunodeficiencia, fiebre > 38°C, enf. neurológica TB sítix, transglutino o que reciben la copiar 3-11 meses	12 meses y 4 y 6 años	Vía subcutánea Brazo izquierdo, en la arca superior externa del tricep.
DP1	0.5ml	Fiebre y síntomas locales	Anafilaxia, encefalopatía, enf. neurológica progresiva, crisis convulsiva	4 años	Vía intramuscular Brazo izquierdo