UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS COMITAN DE DOMÍNGUEZ

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

Nombre de la alumna: Carol Sofía Méndez Ruiz

Nombre del docente: Dra.Lopez Gutierrez Karla Sofía

Tema: cuadro comparativo

Materia pediatría

Grado 6to semestre

Grupo D

Nombre	Fisiológica	Lactancia materna	Incompatibilidad ABO	Incompatibilidad RH
Causas	Aumento de la bilirrubina indirecta	Baja ingesta calórica Por inhibición del ácido glucoronico	Incompatibilidad RH Madres o recién nacido con A,B o AB	Formación de anticuerpos C y D (+ frec)
Dia de aparición	•2-3 días	•4-7 dias Hasta 3-12 semanas post nacimiento	•Primeras 24 horas	•Primeras 24 horas
Síntomas	•Cambios de coloración en la piel •No hidrops	•Cambios de coloración en la piel •No hidrops	•Ictericia leve (puede agravarse) •No hidrops	•Anemia fetal grave •Hidrops •Hiperbilirrubinemia severa
Tratamiento	•Baños de sol •Fototerapia >14mg	•Fototerapia •Espectro 460-490 mm •Luz azul especitubos fluorescentes •Protección solar •Baños de sol <10	•Fototerapia	Profilaxis: •Gammaglobulina anti d-100mg en el primer embarazo En la 28-32 sdg Dosis adicional: 48-72 hrs (En postparto, aborto, amiocentesis) Post natal: •Fototerapia •Extranguineotranfusion