

Cuadro Comparativo

NOMBRE: Abril Amely Valdez Maas

GRADO: 6 GRUPO:D

MATERIA: pediatría

Comitán de Domínguez

Nombre	Causas	Días de Aparición	Síntomas	Dx	Tx
Ictericia por lactancia materna	Enzima: beta-glucuronidasa que puede carecer de la desconjugación de Biliirrubina. ↑ Aum. producción de bilirrubina de la degradación de los glóbulos rojos.	Temprana: Primeros días de vida. Tardía: Después de la primera semana de vida.	• Coloración en piel y mucosas • Letargo • Irritabilidad • Vómitos.	- Hc y examen físico - Medicación de niveles de B. - Frecuencia de tórax.	- Monitoreo de Bilirrubina - Fototerapia en casos graves - Interrumpir lactancia materna 24-48hs antes de iniciar.
Fisiológica	• Debido a la degradación de glóbulos rojos. - Inmadurez del sistema hepático - La B. no conjugada se acumula en sangre y causa ictericia.	2-3 días	• Puede ser asintomático - Gining oscuro - Pérdida de apetito - Heces oscuras - Pálidas o oscuras.	- Hc y examen físico - Medicación de Niv. de B. - La B - Monitoreo	- Fototerapia en algunos casos - Monitoreo de Bilirrubina
Incompatibilidad ABO y Rh. Rh.	Incompatibilidad sanguínea madre y feto	Rh: 1ra y 2da hrs de vida. ABO: 24-48 hrs	Colocación en: - Piel - Mucosas - Hepatomegalia - Anemia - Elevación de B.	- Coombs Directo. - Reducir Niveles.	Prevenir Kernictus - Fototerapia - Exanguíneo - Administración de Rh porq prevenir.