



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**  
**CAMPUS COMITAN DE DOMÍNGUEZ**  
**LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA**



**Nombre de la alumna:** Carol Sofía Méndez Ruiz

**Nombre del docente:** Dra. Karla Sofía López Gutierrez

**Tema:** vacunas

**Materia:** Pediatría

**Grado:** 6to semestre

**Grupo:** D

Vacunas	Dosis	E. Adverso	Contraindicaciones
Neomococica Conjugada	0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eritema</li> <li>ojar</li> <li>Fiebre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiebre &gt; 38.5</li> <li>hipersensibilidad</li> </ul>
Antinfluenza	0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiebre y mialgia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alergia al huevo</li> <li>Guiltian barre</li> <li>Fiebre 38.5 °C</li> </ul>
Triple Viral SRP	0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiebre, Rash</li> <li>cefalea</li> <li>Parotiditis</li> <li>meningitis</li> <li>Perfora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inmunodeficiencias</li> <li>Fiebre &gt; 38.5 °C</li> <li>transfusión</li> <li>Reciben 1g</li> <li>esperar 3-11 meses.</li> </ul>
DTP	0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiebre y sx locales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inmunodeficiencias</li> <li>Fiebre &gt; 38.5 °C</li> <li>transfusión</li> <li>Reciben 1g</li> <li>esperar 3-11 meses.</li> <li>crisis</li> <li>Anafilaxia, Convuls</li> <li>encefalopatia. enf</li> <li>neurologica</li> </ul>
Antinfluenza	0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiebre y mialgia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alergia al huevo,</li> <li>Guiltian barre.</li> </ul>
Hepatitis A	0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiebre</li> <li>Dolor de cabeza</li> <li>conancio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 1 año</li> </ul>
Varicela	0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiebre y mialgia.</li> </ul>	
VPH	0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sx gastrointes- tinales y locales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 4 años de edad</li> <li>inmunodeficiencia</li> <li>Fiebre</li> </ul>
Antirrotavirus	1.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sx gastrointes- tinales</li> <li>Fiebre</li> <li>irritabilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alergia al latex</li> <li>Ant. de Intubación</li> <li>malf. congénitas.</li> </ul>
Hexavente acobar	0.5 ml		
BCG	0.1 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pápula del de cabeza y cicatrizada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIDA</li> <li>leucemia</li> <li>Neoplasia</li> <li>Sx inmu- nológico</li> </ul>
Hep. B	0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiebre sx</li> <li>Fatiga crónica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiebre &gt; 38.5 °C</li> <li>hipersensibilidad</li> </ul>

Via de Administración	Edad de aplicación
Intramuscular	1 dosis: 2 meses 2 dosis: 4 meses 3ra dosis: 6 meses
Intramuscular	6 meses
Subcutanea	1ra dosis: 12 meses 2da dosis: 6 años
Intramuscular	2, 4, 6, 18 meses
Intramuscular	6 meses
Intramuscular	12 meses
Subcutanea	1: 12 meses 2: 15 meses
Intramuscular	11 años
Oral	1 dosis: 2 meses 2 dosis: 4 meses
Intramuscular	6 meses
Intradermico	Nacimiento
Intramuscular	1 dosis: 24 hrs 2 dosis: 1 y 2 meses 3 dosis: 6 y 18 meses