



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

NOMBRE DEL ALUMNO: SERGIO

RODRIGO FLORES DIAZ

NOMBRE DEL MAESTRO: DRA. KARLA

SOFIA GUTIERREZ LOPEZ

COMITAN DE DOMINGUEZ

CARACTERÍSTICAS	CAPUT SUCCEDANEUM	CEFALOHEMATOMA
DEFINICIÓN	Edema del tejido subcutáneo del cuero cabelludo causado por la presión del canal del parto.	Acumulación de sangre entre el periostio y el hueso craneal debido a la ruptura de vasos sanguíneos.
LIMITACIONES	No está limitado por las suturas craneales; puede extenderse más allá de los márgenes óseos.	Limitado por las suturas craneales; se encuentra confinado a un solo hueso (parietal, generalmente).
CONTENIDO	Líquido serosanguinolento (edema blando).	Sangre (colección hemática).
TIEMPO DE REABSORCIÓN	Se reabsorbe en 48-72 horas.	Puede tardar de 2 semanas a 3 meses en resolverse.
MOMENTO DE APARICIÓN	PRESENTE AL NACIMIENTO.	SE HACE EVIDENTE HORAS DESPUÉS DEL NACIMIENTO.