Portada

Nombre del Alumno: Débora Mishel Trujillo Liévano

Nombre del tema: tipos de ictericia

Parcial: 3

Nombre de la Materia: pediatría

Nombre del profesor: Karla Sofía López Gutiérrez

Nombre de la Licenciatura: medicina humana

Cuatrimestre: 6

Fecha de elaboración: 30 de mayo del 2025

Nombre	Causas	Síntomas	Días de aparición	Tratamiento
Ictericia fisiológica	-infecciones: sepsis/TORCH -anemias hemolíticas	-coloración amarillenta de la piel y mucosas	2-3 días (nunca en las primeras 24 horas) -duración menos de 10 días.	Fototerapia -bebe bi8en hidratado y nutrido.
Ictericia de lactancia materna	Hiper bilirrubinemia	- coloracion amarillenta Llanto agudo Fatiga Poco aumento de peso	-4-7 días hasta 3-12 semanas pos nacimiento	Fototerapia Exanguineo transfusión
Ictericia por incompatibilidad rh	Incompatibilidad del grupo RH	-potencial mente mas grave (anemia fetal grave) - hiperbilirrubinemia severa. Hidrops.	-segundo embarazo	Foto terapia Sanguíneo transfusión
Incompatibilidad a, b, o	incompatibilidad sanguínea -la madre tiene anticuerpos contra el grupo sanguíneo ABO	-ictericia leve (puede agravarse)	-se crean ac naturales desde el primer hembarazo	Foto terapia