

ENF. RESPIRATORIAS.

Nombre del alumno:
Katia Marlen Espinosa Sánchez.

Nombre del profesor:
Dra. Karla Sofía Gutierrez López.

Parcial: 4to parcial.

6to. semestre / 6to. D.

Materia: Pediatría.

Nombre.	Epidemiología.	Etiología.	Clínico.	Diagnóstico.	Tratamiento	Clasificación.
<u>Resfriado común.</u>	• Otoño / primavera. • Fx protectores: • Lavado de manos • vacunación. • LM. • Fx riesgo: • Guardería • clima templado.	• Rinovirus 80-90%	• Congestión nasal. • Fiebre. • Odinofagia. • Irritabilidad. • Disfonía. • Tos. • Congestión conjuntival.	• Clínico.	• Paracetamol 10mg/kg peso. • NO farmacológico. • Eucalipto. • Miel de tugo. • vapores inhalados	
<u>Faringoamigdalitis.</u>	• + infancia.	• Origen viral 80-90% • Rinovirus. • Coxsavirus • Adenovirus.	• Criterios de centor: • <2 puntos → Sintomático. • 3 puntos → p. rápido de antígeno. • SBHGA. • +4 puntos → ATB • Cultivo Faringeo (Gold standar).		• Paracetamol. • <27 kg penicilina G Benzatina 600,000 UI IM DU. • >27 kg penicilina G Benzatina 1200,000 IM DU. • Alergia → Eritromicina / azitromicina. • 1/4 de cucharada de bicarbonato en un vaso de agua.	
<u>Tos ferrea.</u>	• + invierno. • 6 meses - 3 años • >20 años. • + contagiosa.	• Bordetella Pertussis Gram-	• F. catarral: síntomas leves (R. común). • F. paroxística: 3-4 semanas, accesos de tos cansante estridor inspiratorio. • F. convalecencia: tos desaparece lento.	• Clínico • Labs → linfocitos. • GS → Cultivo nasofaríngeo (3-4 semanas).	• F. catarral → Eritromicina por 14 días + vacuna hexavalente. • Alergia → TMP-SMX. • Profilaxis → Eritromicina por 14 días. • Vacuna TdPA >7 años embarazadas 27-36 SDE.	
<u>Bronquitis.</u>	• 3-6 meses de edad. • <2 años. • Nov / Mar. • Ambiente con fumadores.	• Virus sinatral respiratorio. • Metapneumovirus. • parainfluenza.	• 1-3 días → Febrícula + muerca + tos. • 4-6 → Taquipnea, hipoxia, sibilancias, cianosis. • sibilancias espiratorias (Lactante sibila).	• Clínico (24-48hs). • Rx de torax. • Prueba rápida (Agente causal).	• Sintomático. • Nebulización con NACL al 3%. • O2 → Sat. <90%. • Salbutamol.	• Escala de Wood - downes.
<u>Asma.</u>	• Desencadenantes: alérgenos. • Inf. Respiratorias. • Protectores: CM • convivir con mascotas.	• Reacción de Hipersensibilidad tipo 1.	• Tos (+ común). • Disnea. • Opresión torácica. • predominio nocturno.	• Clínica (20+ síntomas clave). • Espirometría con prueba de reversibilidad con bronco dilatador • <5. corticoesteroides inhalado.	• NO farmacológico. • Tx Base: • Rescate → Salbutamol. • >12 años → Formoterol + CEI. • 2 → Corticosteroides inhalados dosis ↓ • 3 → CEI + LABA o CEI media. • 4 → Esp. CEI + LABA. • 5 → Formoterol.	• Intermitente • Leve persistente. • Moderada persistente • Grave persistente.