NOMBRE DEL ALUMNO: SERGIO RODRIGO FLORES DIAZ
 NOMBRE DEL MAESTRO: DR. DE LA ROSA PACHECO RAUL
 MATERIA: PEDIATRÍA
 FECHA: 26 DE MAYO DEL 2025
 Comítan de Dominguez, Chiapas

	Fisiológica	Lactancia materna	Incompatibilidad
Nombre	Ictericia Fisiológica	Ictericia por lactancia materna.	Ictericia por incompatibilidad sanguínea (ABO/Rh).
Causa	Inmadurez hepática que limita la conjugación de bilirrubina y aumento en la producción de bilirrubina por alto recambio de glóbulos rojos.	Ingesta insuficiente de leche materna, lo que causa deshidratación, lo que hace que haya menor eliminación de bilirrubina.	Hemolisis por incompatibilidad Rh o ABO, lo que provoca una liberación excesiva de bilirrubina. ABO: Madre de grupo sanguíneo O y el bebé es A o B Rh: Cuando la madre es Rh negativa h el bebé Rh positivo
Síntomas	Coloración amarilla de piel y mucosas.	Ictericia leve a moderada, pérdida de peso, signos de deshidratación.	Ictericia temprana, anemia, palidez, hepatoesplenomegalia, letargo.
Día de aparición	Después de las 24 hrs de vida, entre en 2do y 3er día.	Del 3er día al 5ta día de vida, puede prolongarse a la 2da semana de vida.	Antes de las 24 horas de vida.
Tratamiento	Generalmente no requiere tratamiento, solo observación, si la bilirrubina supera los límites seguros se recomienda fototerapia.	Mejorar técnica y frecuencia de lactancia, si persiste o es severa aumentar ingesta (extracción de leche o fórmula temporalmente) rara vez foto terapia.	Fototerapia intensiva inmediata, si no responde o hay riesgo de kernicterus: exanguinotransfusión, inmonoglobulina IV si es Rh.