




Nombre del alumno: Carlos Ulises Gordillo Cancino
6to Semestre, Grupo D

Docente: Dra. Karla Sofía Lopez Gutiérrez

Materia: Pediatría

Comitán de Domínguez, Chiapas. A 09
de Abril del 2025

Vacuna	Dosis de administración	Vía de administración	Edad de aplicación	Contraindicaciones	Efectos Adversos.
Triple Viral SRP.	0.5 ml	Vía Subcutánea.	• 12 meses y segunda a los 6 años.	> Fiebre ($>38.5^{\circ}\text{C}$), enf. neurológicas. Inmunodeficiencia, etc.	> Fiebre, rash, cefalea, meningitis, purpura.
Neumococica Conjugada.	0.5 ml	Vía intramuscular.	• 2, 4, 6 y 12-15 meses de edad (1 año, - 1 año 3 meses).	> Fiebre ($>38.5^{\circ}\text{C}$) hipersensibilidad.	> Fiebre e irritabilidad Induración, exitema, etc.
BCG	0.1 ml	Vía intradérmica	• RN (Primeros 7 días de vida).	> Sida, leucemia, neoplasia, tx inmunosupresor, etc.	> Papula que se ulcera y causa cicatriz.
Antiinfluenza	0.5 ml	Vía intramuscular	• 6 meses o mayor a 6 meses.	> Alergia al huevo, Fiebre ($>38.5^{\circ}\text{C}$), Guillain Barre.	> Fiebre y malestar.
Hep B.	0.5 ml	Vía intramuscular.	• 2, 4 y 6 meses de edad.	> Fiebre ($>38.5^{\circ}\text{C}$) hipersensibilidad.	> Fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinales, etc.
Antirrotavirus.	1.5 ml	Vía Oral	• 2, 4 y 6 meses	> Alergia al latex, malformaciones Congénitas anteriores de intususcepción.	> Irritabilidad, fiebre, síntomas gastrointestinales.
DPT	0.5 ml	Vía intramuscular.	• 1 año y medio, 4 años de edad.	> Anafilaxia, Crisis convulsivas, enf. neurológica.	> Fiebre y síntomas locales.
IPV.	0.5 ml	Vía IM en brazo no dominante.	• Apartir de los 9 años.	> <u>No</u> vacunar a < de 9 años, fiebre hipersensibilidad, etc.	> Síntomas GI y locales

Vacuna	Dosis de administración	Vías de administración	Edad de administración	Contraindicaciones	Efectos adversos.
Variola	• 2 dosis (0.5 ml)	Vía Subcutánea	• 12 meses y segunda dosis de 4 y 6 meses.	• Reacción alérgica grave, Fiebre $>38^{\circ}\text{C}$, Inmunodeficiencia, etc.	• Dolor, fiebre, Erupción, dolor articular.
Hepatitis A	• 4 dosis (0.5 ml)	Vía Intramuscular.	• 12 meses de • Niños (4-8 años).	• Reacción alérgica grave • 2 de un año.	• Dolor, enrojecimiento, Fiebre, hinchazón, fatiga.
JR.	• 2 dosis 0.5 ml	Vía Subcutánea	• Apartir de los 10 años.	• Hipersensibilidad, Inmunodeficiencia congénita, Reacción alérgica grave.	• Dolor / hinchazón, Fiebre, zudillo, erupción cutánea leve.
TDPA.	0.5 ml	Vía Intramuscular	• Embarazados (20 SDG). • Pref (27-36 SDG).	• Reacción alérgica grave, • Presentar convulsiones prolongadas, enf. neurológica progresiva.	• Dolor, Fiebre leve, dolor de cabeza, náuseas, vómitos.
DPT.	0.5 ml	Vía Intramuscular.	• Niños menores de 7 años.	• Padecer una enfermedad grave • Temp. $>38^{\circ}\text{C}$.	• Irritabilidad • Eructos • Cansancio • Fiebre • Dolores musculares.