



Nombre del alumno: Carlos Ulises Gordillo Cancino

6to Semestre, Grupo **D**

Docente: Dra. Karla Sofía Lopez Gutiérrez

Materia: Pediatría.

ICTERICIA NEONATAL

	Definición	Síntomas	Aparición	Tratamiento
<u>Ictericia Neonatal (Fisiológica)</u>	• Coloración amarillenta (ictérica) de piel y mucosas en los RN por niveles elevados de Bilirrubina.	- Ictérica (piel / mucosas) - Especialmente en la esclerótica de los ojos	- 2do y 3er día de vida.	→ Monitoreo → Fototerapia (luces especiales para descomponer bilirrubina)
<u>Leche Materna</u>	• Alimento ideal y natural para los bebés.	→ Cambios en las mamas, → Sensación de hormigueo	→ 2do - 4to día después del parto.	→ Monitoreo → Excreción
<u>Incompatibilidad Grupo (RH y ABO).</u>	• Reacciones inmunológicas que ocurren cuando el tipo de sangre no es compatible.	→ Anemia → Ictérica → Hepatomegalia → Esplenomegalia → Hídrio pesu fetal.	* Ocurre cuando los tipos de sangre de la madre no coinciden.	→ Se puede tratar con Inmunoglobulina (Anti-D) → Fototerapia enterogénica.

BIBLIOGRAFIA

Diapositivas utilizadas en clase.

Chikungunya. (s. f.). <https://www.paho.org/es/temas/chikungunya>

Zika. (2025, 7 mayo).

