



Mi Universidad

ESQUEMA DE VACUNACUNACIÓN

Nombre del alumno: Diana Roció
Gomez López
nombre del docente: karla Sofía
López Gutiérrez
medicina humana
materia: pediatria
6-D

VACUNA	DOsis	EFFECTO ADVERSO	CONTRAINDICACIONES	LUGAR DE APLICACIÓN	EDAD
BCG	0.1 ml	Úlcera que se cicatriza 90-95%	SIDA Tx inmunosupresor Leucemia Neoplasia o inmunodeficiencia	Intradermica brazo derecho	Nacimiento
Hepatitis B	0.5 ml	Fiebre Fatiga Síntomas gastrointestinales	Fiebre $>38.5^{\circ}$ Hipersensibilidad	Intramuscular muslo izq $<18m$ brazo derch $>18m$	Primeros 7 días de vida 2 meses 6 meses
Hexavalente Acelular	0.5 ml			Intramuscular brazo izquierdo	2 meses 4 meses 6 meses
Polio oral	1.5 ml	Síntomas gastrointestinales Fiebre Irritabilidad	Alergia al latex Antecedentes de intubación malformaciones congénitas no corregidas de tracto GI	Oral	2 meses 4 meses 6 meses
Difteria tétanos acelular	0.5 ml	Eritema Dolor, fiebre Irritabilidad	Fiebre $>38.5^{\circ}$ hipersensibilidad	Intramuscular Muslo derecho	2 meses 4 meses 12 meses
Antigripal	0.5	Fiebre mialgia	Alergia al huevo Cuillan barre por vacuna previa $>38.5^{\circ}$ Fiebre	Intramuscular brazo izquierdo	6 meses Anual cada refuerzo
Triple viral OP ampion eola titiditis	0.5	Fiebre, rash Ceraica Parotiditis meningitis Purpura	Inmunodeficiencia Fiebre $>38.5^{\circ}C$ Enf. neurológica TB Transfusión o IG Espera 3-11 meses	Subcutanea brazo izquierdo	12 meses 18 meses 6 años

VACUNA	DOsis	EFFECTO ADVERSO	CONTRAINDICACIONES	LUGAR DE APLICACIÓN	EDAD
OPT	0.5 ml	Fiebre Síntomas locales	Anafilaxia encefalopatía enf. neurológica progr. Crisis convulsivas	Intramuscular brazo izquierdo	1 ^a dosis / 6 sem de edad 1^a dosis 2da 10 sem 3era 14 sem
Antigripal	0.5	Fiebre Mialgia	Alergia al huevo Cuillan barre por vacuna previa Fiebre $>38.5^{\circ}C$	Intramuscular brazo izquierdo	Apartir de 100 6 meses todos los años
Hepatitis A	0.5 ml			Subcutanea brazo izquierdo $>18m$ muslo izq $<18m$	12 meses 2da dosis <6 meses desp.
Varicela	0.5 ml			Subcutanea brazo izquierdo Intramuscular	12 meses 2da 4 y 6 meses intervalo >13 años
VPH	0.5 ml	Síntomas GI y locales	No vacunar en menores de 9 años Inmunodeficiencia Fiebre Gestación hipersensibilidad	Intramuscular brazo no dominante	Niñas que comen 5to año de primaria