

Cuadro comparativo

**NOMBRE: Abril Amely Valdez Maas
GRADO: 6 GRUPO:D
MATERIA: Pediatría**

Nombre	Dosis de Adm	Via de ADM	Edad de Aplicación	Contraindicación	Efectos Adversos
Nacimiento BCG	0.1 ml	Intradermica	Nacimiento + 0	SIDA, Tx inmunosupresor, leucemia, neoplasia o inmunodeficiencia	Pápula que se ulcera y cae cicatriz.
Hexavalente Acelular (2) • Polio • Difteria • Tetania • Sarampión • Paperas • Escarlatina	0.5 ml	Intramuscular	2 meses	---	Hipersensibilidad a vacuna
Hexavalente Acelular • Influenza	0.5 ml	Intramuscular	6 meses	---	Hipersensibilidad a componentes
• Influenza 2 años	0.5 ml	Intramuscular	7 meses	Inmunodeficiencia	Reacción de hipersensibilidad. Fiebre.
SRP (1) Neumococo conjugado	0.5 ml	Subcutánea	12 meses	Fiebre Hipersensibilidad	eritema dolor fiebre
Hexavalente Acelular - SRP - Influenza	0.5 ml	Intramuscular	18 meses	---	Reacción de hipersensibilidad
DTP (Refuerzo)	0.5 ml	Intramuscular	48 meses (4 años)	Reacción anafiláctica o encefalopatía espórica	Reacción anafiláctica
COVIDA	0.5 ml	Intramuscular	5 años	- inmunodeficiencia	Dolor eritema fiebre
SRP (2)	0.5 ml	Intramuscular	6 años	Inmunodeficiencia Fiebre enf. neurológico	Fiebre rash cefalea.

11 años

VP
H
TDPA

0.5 ml

Genera
Daor
Eritema