



Mi Universidad

ABORTO /SOP

Nombre del Alumno: Gabriel de Jesús Martínez Zea

Nombre del tema: Tipos de abortos / SOP

Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia

Nombre del profesor: Dra. Arely Guadalupe Aguilar Velasco

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

31/05/2025

Síndrome de Ovario Poliquístico

Definición: Trastorno endocrino y Metabólico Heterogéneo que Afecta a la Mujer.

Causas: - Genética - Factores Ambientales
Obesidad o IMC > 35

Epidemiología: - Afecta al 6% de las Mujeres en Edad Fértil - Esterilidad en Mujeres
- Cáncer endometrial o de mama
- Coexiste Resistencia a la Insulina 35%

Fisiopatología:

- Componentes Genéticos
- Gen del Receptor LH, FSH, Insulina, andrógenos y globulina.

Clinica:


- Trastorno Menstrual
- Hiperandrogenismo - Irregularidad - Acné
- Alopecia - Obesidad
- Vello Corporal: Unas AIBA, Bigote, Barba, piernas, Brazos, Dorso y Espalda.

Diagnóstico:


Laboratorio =

- Niveles séricos de testosterona - Progesterona sérica
- Niveles de progesterona - USG Pélvica o Vaginal
- Hormona FSH

• Prueba de glicemia: Ayunas, PTG.



 21/06/25



Gabriel 6-D

Tipos de Abortos

Aborto Espontáneo: Se presenta en 50 a 70% de los embarazos.

↳ La mayoría de estas pérdidas son irreversibles debido a que suceden antes de que se presente la siguiente menstruación.

• Factores Fetales

↳ Factores genéticos: Se presenta en el primer

Aborto Espontáneo Trimestre 50 a 60% de los embarazos son expulsados.

• Factores Maternos

↳ Infecciones: Clamidia, Sífilis, Toxoplasmosis, Toxoplasma G., Gonorrrea.

↳ Indirecto ↳ Directo.

• Endocrinos:

- **Hipotiroidismo** → Deficiencia pronunciada de yodo se acompaña de abortos.

• Los Anticuerpos Antitiroideos se han asociado a una mayor frecuencia de abortos.

- **Diabetes** → Frecuencia de Aborto Espontáneo como de Malformaciones Congénitas.

• **Toxcomomicis** → Asociada a un estado con un mayor riesgo de padecer abortos Euploides. El riesgo aumenta con el número de cigarrillos que consume la gestante al día.

- **Alcohol** → Síndrome Alcohólico Fetal (5 unidades (Seguro))

- **Cafeína** → El consumo de café de 300 mg/día tienen un riesgo más alto de padecer Aborto. menor a esta dosis se considera segura.

Primeras 2 Causas de Aborto en Primigesta:

- Mala Implantación en cuerpo lúteo
- Infecciones

Otros:

- Enfermedades Congénitas
- Traumatismos
- Cirugía Abdominal Materna
- Insuficiencia Cervicouterina
- Miomas
- Polipos

- Insuficiencia Cervicouterina: Se caracteriza por dilatación del cuello uterino indolora durante el segundo trimestre

- provoca prolapso y abombamiento de las membranas en el interior de la vagina y finalmente expulsión del feto inmediato.

- Causa de Insuficiencia Cervicouterina

La relación con traumatismos previos del cuello uterino como dilatación y legrado, cauterización o amputación.

- Tratamiento: Cercaje ~~Cervical~~ Cervical

Este da la fuerza de manera quirúrgica al cuello uterino al ser con colocación de una sutura en bolsa de jabaco.

Contraindicaciones: Hemorragia, OX

Amenaza de aborto: Diagnóstico Clínico de Amenaza de aborto Se sospecha cuando aparece

- secreción sanguinolenta
- Hemorragia vaginal por el orificio cervical cerrado durante la primera semana del 2º tr.

Prevalencia: Se cree del 20 al 25% Al principio

↳ El 50% de los abortos de Aborto

Un cuadro de SOP / Aborto