

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

NOMBRE DEL ALUMNO: Sergio Rodrigo Flores Diaz

NOMBRE DE LA MAESTRO: Dr. Medellín Adolfo

NOMBRE DE LA MATERIA: Enfermedades infecciosas

GRADO: 6to

GRUPO: D

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

	Dengue	Zika	Chikungunya
Patología	Enfermedad infecciosa viral sistémica y dinámica, transmitida por el mosquito Aedes	Enfermedad viral transmitida por mosquitos, con riesgo de complicaciones neurológicas y congénitas	Enfermedad viral aguda con síntomas articulares severos, transmitida por mosquito Aedes
Definición	Infección por arbovirus que puede variar desde asintomática hasta cuadros graves potencialmente mortales.	Virus transmitido por mosquitos; identificado en humanos desde los 50 años; relacionado con malformaciones congénitas.	Enfermedad viral febril que causa dolor articular severo, el nombre significa "el que se encorva"
Agente Etiológico	Virus del Dengue • DENV-1 • DENV-3 • DENV-2 • DENV-4 género Flavivirus	Virus del Zika, género Flavivirus, familia Flaviviridae.	Virus del Chikungunya, del género Alphavirus, familia Togaviridae
Vector	Aedes aegypti y Aedes albopictus (hembras)	Aedes Aegypti.	Aedes aegypti y Aedes albopictus
Clasificación	- Dengue sin signos de alarma - Dengue con signos de alarma - Dengue grave	No cuenta con una clasificación formal en el documento "GPR"	Clasificación por fase - Aguda: 3-10 días - Subaguda: 2-3 meses - Crónica: >3 meses hasta 18 meses o más
Cuadro Clínico	- Fiebre + al menos 2 de: Cefalea, mialgia, exantema, dolor retroocular, náusea, petequias, Leucopenia - Exantema típico en 2 fases	- Exantema pruriginoso (3º-5º día) más 2 de: Fiebre, cefalea, conjuntivitis no purulenta, mialgia, artralgias, prurito, dolor retroocular	- Fiebre súbita >39°C, artralgias severas simétricas, exantema, cefalea, mialgias, náusea, vómito, lumbalgia y conjuntivitis
Diagnóstico	- NSI: ≤ 5 días - PCR: Fase febril - IgM/IgG: > 5-7 días - Test de IgG2 (taniquir) - Triplex RT-PCR para Dengue / Zika / Chikungunya	- Triplex RT-PCR - Viaje en zonas endémicas - Contacto sexual con alguna expuesta en 8 semanas previas	- Triplex RT-PCR - Diagnóstico clínico por fase y síntomas
Tratamiento	- Paracetamol - Reposo - Hidratación oral - Evitar AINES - Vigilancia de signos de alarma	- Manejo sintomático, se infiere que es similar a Dengue y Chikungunya	- Manejo sintomático - Paracetamol - Tratar dolor - Hidratación Articular según severidad
Consideraciones especiales	- Embarazo: Hospitalizar - Peditátricos: Vigilancia especial, no - Adultos Mayores: riesgo de STD y daño viral	- Riesgo de malformaciones congénitas * microcefalia * Guillain-Barré - Alteraciones neurológicas y oculares	- Dolor articular puede persistir meses-años - Puede afectar calidad de vida crónicamente