UNIVERSIDAD DEL SURESTE.
CAMPUS COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.
MEDICINA HUMANA.

NOMBRE DEL ALUMNO:

Karen Itzel Rodríguez López

PARCIAL: 3° PARCIAL.

SEMESTRE: 6°. **GRUPO:** D

NOMBRE DE LA MATERIA:

Técnicas quirúrgicas básicas

TRAUMATISMOS TORÁCICOS

Epidemiología	<ul style="list-style-type: none"> • Presentes en el 75% de los politraumatizados • 43% por accidentes de vehículos de motor. • La hipoxia es la consecuencia torácica más seria 				
Nombre	Definición	Etiología	Clínica	Diagnostico	Tratamiento
Neumotórax simple	Entrada de aire al espacio pleural por laceración pulmonar, con alteración V/Q con hipoxia e hipercapnia.	Fractura costal	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de ruidos respiratorios • Timpanismo e hiperresonancia • Disnea • DR • Hipoxia 	Clínico+ Rx(Mayor radiolucides en área afectada)	<ul style="list-style-type: none"> • Neumotórax menor (<15 cm): TX con alto flujo oxígeno > a 15L/min • Definitivo: Pleurostomia con sonda endopleural de 28 fr en 5° EIC en LAA
Neumotórax a tensión	Lesión que ocurre cuando se filtra aire a través de una válvula unidireccional desde el pulmón a través de la pared torácica.	Secundario a uso de ventilación mecánica invasiva en px con lesión pleural visceral	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de ruidos respiratorios • Taquicardia • Hipotensión • Ingurgitación yugular • Hiperresonante a la percusión 	Clínico+ Rx (desplazamiento de estructuras como la tráquea)	<ul style="list-style-type: none"> • Inicial: Descompresión en 5° EIC en LAA con aguja de 8cm. • Definitivo: Sonda de pleurostomia de 28 a 32 fr en 5° EIC en LAA

			<ul style="list-style-type: none"> • Shock obstructivo 		
Neumotórax abierto	Son grandes lesiones de la pared torácica que quedan abiertas también conocidas como herida torácica succionante	De una herida penetrante del tórax	<ul style="list-style-type: none"> • Herida que respira. •olor torácico. • Hipotónico a percusión. • Hipoxia. • Hipercapnia. 	Clínico	<p>Inicial: Válvula unidireccional apósito oclusivo en solo 3 lados</p> <p>Definitivo: Tubo pleural 5° EIC en LMA y reparación qx del efecto.</p>
Hemotórax simple	Derrame pleural el cual se acumula sangre < 1500ml y generalmente hay > del 50% de HTO en liquido pleura	Laceración (Pulmón, vasos, arteria mamaria interna) y fracturas de columna vertical torácica	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de murmullo vesicular. • Matidez a la percusión. 	Clinico Rx. Toracocentesis.	Sonda de pleurostomia de gran calibre en linea axilar anterior 5° espacio intercostal.
Hemotórax masivo	Acumulación de sangre >1500ml o drenaje > de200ml/hr o > de 1/2 o del volumen sanguíneo en la cavidad torácica.	Laceración (Pulmón, vasos, arteria mamaria interna) y fracturas de columna vertical torácica	<ul style="list-style-type: none"> • Choque hipovolémico. • Venas del cuello aplanadas. 	Clinico + Rx (radiopacidad)	<p>Inicial: Reposición de volumen+ descompresión con sonda endopleural de 28-32 fr en 5° EIC en LAA</p> <p>Definitivo: Toracotomía</p>
Taponaje cardiaco	Acumulación de sangre en cavidad pericárdica que dificulta llenado de cavidades.	Trauma penetrante	<ul style="list-style-type: none"> • Triada de BECK (Hipotensión arterial+ Disminución de ruidos cardiacos+ Ingurgitación yugular. 	Clinico+ USG FAST	<p>Inicial: Pericardiocentesis guiada por USG</p> <p>Definitivo: Toracotomía con ventana pericárdica</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Actividad eléctrica sin pulso • Sincope • Hipoxemia 		
Tórax inestable	Fractura de 2 o más costillas adyacentes con alteración en la cinética de ventilación.	Trauma asociado a múltiples fracturas costales.	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor durante movimiento respiratorio. • Movimiento asimétrico entre ambos hemitórax. • Crepitaciones • Edema • Golet costal 	Clinico+ Rx	Inicial: Oxigenación, hidratación analgesia y en caso de hipoxemia intubación endotraqueal Definitivo: Qx RAFI
Ruptura traumática de la aorta	Lesión en la capa íntima de la aorta	Trauma por desaceleración, caídas de gran altura o accidentes de tránsito	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor torácico agudo apresivo • Hipotensión refractaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Clínico + Rx (ensanchamiento mediastinal > de 8 cm, obliteración de botón aórtico, desviación de tráquea o esófago a la derecha). • Clasificación de Stanford o de Bakey • Confirmatorio: Angiotomografía 	Controlar la TA con propranolol con meta de <80 lpm y TAM de 60-70 mmHg Definitivo: Drenaje amplio del espacio pleural y mediastino, con reparación directa de la lesión.
Lesión del árbol traqueo bronquial	Lesión en la tráquea a 2.4 cm de la carina en donde el bronquio derecho es el más afectado.	Desaceleración rápida en un trauma contundente, aplastamiento o trauma cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> • Hemoptisis. • Neumotórax hipertensivo. • Cianosis 	<ul style="list-style-type: none"> • Clínico+ broncoscopia 	Vía aérea definitiva con tubo endotraqueal asistida por fibra óptica Definitivo: Cirugía

			<ul style="list-style-type: none"> • Enfisema subcutáneo cervical. • Salida de grandes cantidades de aire posterior a la colocación de sonda endopleural. 		
Ruptura esofágica por trauma	Trauma cerrado con desgarro lineal por aumento de presión intrabdominal hacia el esófago.	Consecuencia de un trauma penetrante.	<ul style="list-style-type: none"> • Neumotórax izquierdo sin fracturas costales. • Golpe en la parte inferior del esternón o epigastrio. • Dolor o shock sin una lesión aparente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Radiografía de tórax (neumomediastino e hidroneumotorax) 	Drenaje amplio del espacio pleural y mediastino, con reparación directa de la lesión.

TRAUMATISMOS ABDOMINALES

Epidemiología	<ul style="list-style-type: none"> • más comunes en hombres jóvenes • Incidencia anual de traumatismos abdominales puede ser de 7,2 por 100.000. • Se han reportado múltiples lesiones abdominales en una proporción significativa de pacientes (44%). 				
Nombre	Definición	Etiología	Clínica	Diagnostico	Tratamiento
Trauma cerrado	Sin solución de continuidad en peritoneo	<ul style="list-style-type: none"> • Bazo 40-55%. • Hígado 35-45%. • Riñón 15% (retroperitoneal) • Intestino delgado 5-10%. 		<ul style="list-style-type: none"> • Si hay estabilidad hemodinámica: TAC y si no está disponible un USG-FAST y como última opción el lavado peritoneal • No hay estabilidad hemodinámica: USG FAST y si no hay disponible el lavado peritoneal 	Laparotomía
Trauma abierto/ penetrante	Con solución de continuidad en peritoneo que pone en contacto la cavidad abdominal con el exterior.	Herida por arma blanca. <ul style="list-style-type: none"> • Hígado 40%. • Intestino delgado 30%. • Diafragma 20%. Herida por arma de fuego. <ul style="list-style-type: none"> • Hígado 30%. • Intestino delgado 50%. • Colon 40%. 		Trauma abierto(estable) <ul style="list-style-type: none"> • Si hay estabilidad hemodinámica: TAC y si no está disponible un USG-FAST y como última opción el lavado peritoneal • No hay estabilidad hemodinámica: 	Estable: Laparotomía Inestable: Tomar en cuenta las indicaciones para una laparotomía

				USG FAST y si no hay disponible el lavado peritoneal	
Lesión duodenal	Paciente con antecedente de impacto frontal / golpe directo de abdomen.	<ul style="list-style-type: none"> • Manubrio de bicicleta • Colisiones vehiculares con impacto frontal 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiración de sangre por SNC. • Aire en retroperitoneo en tomografía. 	TAC de doble contraste Escalas de las lesiones duodenales	Laparotomía
Lesión pancreática	Paciente con antecedente de golpe directo en epigastrio	<ul style="list-style-type: none"> • Trauma cerrado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enzimas pancreáticas como la amilasa se elevan. • Dolor abdominal • Hemorragia interna 	TAC de doble contraste.	<ul style="list-style-type: none"> • Inicial: se enfoca en la reanimación y estabilización hemodinámica, con control de la hemorragia y minimización del derrame gástrico • Pancreatectomía, pancreatorrafia, drenaje de colecciones, o en casos más complejos, reconstrucción quirúrgica del conducto pancreático.
Lesión hepática	lesión del hígado causada por un trauma, ya sea contuso o penetrante	<ul style="list-style-type: none"> • traumatismos penetrantes (como una herida por arma blanca o arma de fuego) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor • Defensa abdominal (sensación de rigidez muscular). • Hematomas abdominales. • Signos de pérdida de sangre en casos graves. 	exploración física, análisis de sangre y estudios de imagen como tomografía computarizada (TC) o ultrasonido..	<ul style="list-style-type: none"> • reposo en cama, abstinencia de alimentos y bebidas, control del dolor, hidratación intravenosa y transfusiones de

			En casos graves, síntomas de shock.		sangre si es necesario. • Qx si esta inestable
Lesión esplénica	Órgano mas afectado en traumatismos penetrantes.	• Golpe o un impacto profundo	<ul style="list-style-type: none"> • Hemorragia e irritación peritoneal en área esplénica. • Signo de Kehr: Dolor en hombro izquierdo secundario a irritación diafragmática en la ruptura esplénica 	<ul style="list-style-type: none"> • Ultrasonido abdominal. • Tomografía computarizada. • Escala de AAST 	Laparotomía