



Dana Yanelly Solano Narvaez

QFB. Hugo Nájera Mijangos

Parasitosis intestinal

Microbiología y parasitología

PASIÓN POR EDUCAR

2 semestre

Grupo “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de junio de 2025.

TRICHINELLA

ESPECIES


- T. Spiralis • T. Britovi
- T. Nativa • T. Murrelli
- T. Nelsoni • T. Papuae
- T. Pseudospiralis
- T. Zimbabweensis

CARACTERÍSTICAS VECTOR

- No hay vector biológico.
- Transmisión directa x consumo de carne infectada.
- Reservorios principales:
 - Cerdos domésticos
 - Jabalíes

MORFOLOGÍA

- **Macho** {
 - Mide 1mm x 60 de diámetro.
 - Extremo anterior delgado y un extremo posterior con 2 papilas.
- **Hembra** {
 - Mide 2mm x 150um de grosor.
 - Presenta la vulva en la cara ventral de su cuerpo.
- **Larvas** {
 - Verme cilíndrico.
 - 10um de longitud x 6mm de grosor enroscada en 2 porciones.



ENTEROBIUS

ESPECIE

→ Enterobius vermicularis

MORFOLOGÍA

• Parasito visible

Adultos:

• Macho { - mide 2-5mm de largo x 0,2mm.
- espícula copuladora visible en P.A.
↳ Tiene salientes quitinosos (alélulas).


• Hembra { - mide 1cm de longitud x 0,5mm grosor.
- extremo posterior visible.
- alélulas visibles en P.A.

• Huevo { - mide 50-60 x 20-30 µm.
- doble cubierta transparente
larva en su interior. { - Cara plana.
- Cara convexa.

CARACTERÍSTICAS VECTOR

→ No se menciona un vector
• Dientamoeba fragilis
↳ Quistes transportados

CICLO BIOLÓGICO



Referencia bibliográfica:

Romero Cabello, R. (2018). *Microbiología y Parasitología Humana: Bases etiológicas de las enfermedades infecciosas y parasitarias* (4^a ed.). Editorial Médica Panamericana.