

Salud pública

CARTILLA DE VACUNACIÓN



Nombre del alumno: Alondra Elizabeth Trujillo
morales

Catedrático: dra Maria Isabel Cruz López

CARTILLA DE VACUNACIÓN

BCG

1



enfermedad que previene, tuberculosis meningea y miliar

docis : única

edad: al nacer, edad límite antes de los 7 años
persona que lo recibe : recién nacido o Personas con un riesgo elevado de contraer tuberculosis, como los trabajadores de la salud.

2


HEPATITIS B

enfermedad que previene, previene la epatitis B
docis : 1 al nacer, 2 a los dos meses de edad, 3 a los 6 meses de edad

persona que lo recibe : Bebés*: La primera dosis se administra al nacer

- *Niños y adolescentes*: Si no se recibió la vacuna en la infancia, se recomienda vacunarse a los 11 o 12 años.

- *Adultos*: La vacuna se recomienda para adultos de 19 a 59 años que no han sido vacunados previamente. Para adultos de 60 años o más.



DPHEXAVALENTE

3

Vacuna HEXAVALENTE

✓ Previene la **difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B.**

CONSISTE EN 4 DOSIS



- 1ra - A los 2 meses.
- 2da - A los 4 meses.
- 3ra - A los 6 meses.
- 4ta - A los 18 meses.

Acude a tu Centro de Salud más Cercano y

VACÚNATE

CARTILLA NACIONAL DE SALUD

Combate la enfermedad: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, epatitis b, influenza tipo b, como neumonía y meningitis. La primera se aplica a los 2 meses, segunda a los 4 meses, tercera a los 6 meses y de refuerzo a los 18 meses

4

DPT

enfermedad que previene: Difteria, Tosferina y Tétanos

persona que lo recibe : niños de 4 años, refuerzo a los 15 años


Dosis: refuerzo

Incidencia: En el caso de la tos ferina, se ha observado que la vacuna DTPa reduce la incidencia de la enfermedad en un 60-99% después de una serie de 3 dosis, y la protección dura entre 5 y 7 años

**-Difteria.
-Tos ferina.
-Tétanos.**

Vacuna pentavalente
Vacuna DPT

DRA LUJAN BEOVIDE.




ROTAVIRUS

5

enfermedad que previene: Diarrea por Rotavirus

persona que lo recibe : primera vacuna niños de 2 meses y segunda a los 4 meses.

Incidencia: La vacuna contra el rotavirus ha logrado reducir significativamente la incidencia de la enfermedad en México y en la región de América Latina y el Caribe. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se ha observado una disminución del 64%



CARTILLA DE VACUNACIÓN

NEUMOCÓCICA 6



enfermedad que previene:

Neumonía, meningitis y otras enfermedades graves causadas por neumococo por Rotavirus
persona que lo recibe : primera vacuna niños de 2 meses y segunda a los 4 meses y de refuerzo a los 12 meses.

7 SRP (TRIPLE VIRAL)

enfermedad que previene:

Sarampión, Rubéola y Parotiditis
persona que lo recibe : primera vacuna niños de 12 meses y segunda a los 18 meses a 6 años



INFLUENZA 8

enfermedad que previene: Neumonía por virus de la influenza A y B

persona que lo recibe : primera vacuna niños de los 6 meses y segunda a los 4 semanas de la primera dosis, y dosis anual cada temporada invernal del primer año hasta los 4 años.



9 COVID 19

enfermedad que previene: Formas graves de COVID-19

persona que lo recibe : Adultos: La mayoría de las vacunas contra el COVID-19 están autorizadas para su uso en adultos de 18 años o más.

- Adolescentes: Algunas vacunas, como la de Pfizer-BioNTech, están autorizadas para su uso en adolescentes de 12 a 17 años.

- Niños: Algunas vacunas, como la de Pfizer-BioNTech, están autorizadas para su uso en niños de 5 a 11 años.



VPH 10

enfermedad que previene: Infección por el Virus del Papiloma Humano
persona que lo recibe : Niñas de 10 a 14 años dosis única

Incidencia: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna contra el VPH puede reducir la incidencia del cáncer cervicouterino en un 90% si se administra antes de la exposición al virus

Bibliografía

Cartilla nacional de salud

<https://www.gob.mx/salud/documentos/cartillas-nacionales-de-vacunacion-version-2023>