



UDS
Mi Universidad

TIPO DE ACTIVIDAD:

MAPA COMCEPTUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: JOSE SANCHEZ ZALAZAR

TEMAS: TIPOS DE SHOCK

PARCIAL: I

NOMBRE DE LA MATERIA: URGENCIAS

CATEDRÁTICO: JOSÉ DANIEL ESTRADA MORALES


LICENCIATURA: MEDICINA HUMANA

GRADO: 8VO

SHOCK CARDIOGÉNICO

Sx. Clínico causado por la falla del corazón como bomba, en presencia de un adecuado volumen intravascular.


- a) Hipoperfusión tisular
- b) Hipoxia tisular



SHOCKE OBSTTRUCTIVO


Obstrucción de flujo sanguíneo de corazón y grandes vasos

- <Gasto cardiaco
- Hipoxia tisular sistémica
- Déficit llenado cardiaco



SHOCKE HIPOVULEMICO

El choque hipovolémico es una condición producida por una rápida y significativa pérdida de volumen intravascular provocando consecuentemente inestabilidad hemodinámica, disminución de la perfusión tisular, del intercambio gaseoso, hipoxia celular, daño a órganos y la muerte.



SHOCKE DISTRIBUTIVO

vasodilatación sistémica profunda que se asocia a la disminución del volumen intravascular por extravasación de este hacia el intersticio.

FP: Vasodilatación generalizada → ↓Caída de la resistencia (RVP) → ↓P.A

