



Mi Universidad

Ensayo

Nombre del Alumno: Jorge Ghandi Gordillo López

Nombre del tema: Flash Card

Unidad: II

Nombre de la Materia: Crecimiento y desarrollo

Nombre del profesor: Dra. Adriana Sánchez Morales

Nombre de la Licenciatura: Medicina

11 de abril, 2025.

Introducción

El RCIU es una identidad de gran relevancia en salud pública, fundamentalmente en países de vía de desarrollo. Para conocer bien la definición de RCIU, es; condición por lo cual un feto no expresa su potencialidad genética de crecimiento.

La atención del RN es crucial para garantizar su bienestar y adaptación al entorno extrauterino, esto va destacar la importancia y la valoración del estado general del bebé, la realización de pruebas como el test de Apgar y la identificación de posibles riesgos neonatales.

El esquema de vacunación en México, es una estrategia fundamental para la prevención de enfermedades y promoción de la salud pública, se puede destacar que este esquema representa un compromiso de gobierno mexicano para garantizar el acceso gratuito y universal a vacunas esenciales, protegiendo a la población contra enfermedades graves.

La exploración física es una herramienta esencial en la evaluación de la salud en todas las etapas de vida, desde el recién nacido, hasta el adulto, se puede destacar que este proceso permite identificar diferentes puntos.

La escala de apgar evalúa rápidamente la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina mediante diferentes parámetros como FC, esfuerzo respiratorio, tonos musculares, reflejos y coloración de piel. La escala de silverman mide la dificultad respiratoria en neonatos, mientras que la escala de corrupto estima la edad gestacional basándose en características físicas y neurológicas.

El control nutricional del niño sano es una práctica esencial para garantizar un crecimiento y desarrollo óptimos, este proceso implica la evaluación periódica de la dieta, el estado nutricional y hábitos alimenticios del niño.

Pases iniciales de un recién nacido. CAP 3

Para los recién nacidos a término y los Prematuros más, vigorosos el Pinzamiento del Cordon Umbilical se debe realizar al menos 30 y 60 segundos.

Todos los recién nacidos necesitan una evaluación rápida. Preguntar si el bebé llora a término, tiene buen tono muscular y si respira o llora. Si la respuesta es NO a cualquiera de estas preguntas, se debe llevar al bebé a un consultorio radiante.

Para los pases iniciales del cuidado de un recién nacido.

Los pases iniciales incluyen: calentar, secar, cubrir, posicionar en lateral y el cuello para abrir la vía aérea, eliminar secreciones de la vía aérea si es necesario.

Utilizar Pulsioximetría y la tabla de objetivos de saturación de oxígeno para seguir el progreso con oxígeno (a), cuando se provea la necesidad de realizar una reanimación, (b) para confirmar su percepción de diátesis central Perforante, (c) si administrar oxígeno adicional, o (d) si requiere ventilación en presión positiva.

Si el líquido amniótico está teñido por meconio y el bebé no se ve vigoroso, llevar al bebé al consultorio radiante para recibir los pases iniciales.

Cuando se debe pinzar un cordón umbilical. En el momento de parto una gran cantidad de sangre del bebé permanece en la Placenta. Si la sangre materna aún está fluyendo hacia la Placenta y el cordón U. No se ha pinchado.

BCG → Vacuna de Camette Guerin → Tuberculosis

Lineamientos Generales → Contribuir a la mitigación, control y eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles

Objetivos → Alcanzar y mantener el 95% de cobertura de vacunación

Clasificación de vacunas → Inactivadas o muertas
Virus atenuados → Todos los organismos

↓
Controlando

Solo hasta 6 hrs

- mantener muy tiempo
- menos eficacia
- 28 días

Refrigeración → 2-8°C

Todas las vacunas con contraindicaciones si hay fiebre

congelación → -18-25

ultima congelación → -90-60

↓ A

Reacción nacida → BCG y → Ocaso unido

↳ Inhibición de crecimiento - persona

Paracetamol en la

Anti hepatitis B → Ocaso del Vacuna Nacida

Control inmunológico → Inmune controlado - menos de 28 días

50m

30m

40m

50m

60m

70m

80m

90m

100m

110m

120m

130m

140m

150m

160m

170m

180m

190m

200m

210m

220m

230m

240m

250m

260m

270m

280m

290m

300m

310m

320m

330m

340m

350m

360m

370m

380m

390m

400m

410m

420m

430m

440m

450m

460m

470m

480m

490m

500m

510m

520m

530m

540m

550m

560m

570m

580m

590m

600m

610m

620m

630m

640m

650m

660m

670m

680m

690m

700m

710m

720m

730m

740m

750m

760m

770m

780m

790m

800m

810m

820m

830m

840m

850m

860m

870m

880m

890m

900m

910m

920m

930m

940m

950m

960m


970m

980m

990m

1000m

Jorge Godillo Zúñiga



La evaluación de APGAR puede realizarse junto a la madre en el primer minuto de vida del recién nacido. Si la evaluación es mayor a 7 el neonato puede seguir con ella acompañando de un sanitario hasta la valoración de los 5 minutos. Si es menor, el bebé debe trasladarse a una zona de atención.

Satisfactorio → 7-10

Dificultad moderada → 4-6

Dificultad muy grave → 0-3

E

Exploración Física del RN

Evaluación de la edad gestacional:

Durante la evaluación se observan varias condiciones que ayudan a establecer o confirmar la EdadG. del RN.

Inspección.

Piel → Comenzar por la observación del color y textura de la Piel.

- Un RN sano es rosado (labios y mucosas) aunque la cianosis (manos y pies azules) es común y normal en los primeros días de vida.
- En niños prematuros, la Piel puede ser más fina o más translúcida en apariencia con mayor cantidad de vasos visibles.
- Un niño postmaturo a menudo tiene Piel agrietada o descamada (en manos y pies).
- Un feto que permanece en el líquido A. Tejido de meconio puede presentar una coloración amarillenta o verde particularmente en el cordón o los uños.
- La Tumor excesiva o la ictericia son anormales en el primer día de vida.
- Observar marcas de nacimiento o hematomas benignos transitorios como exantemas o lesiones que pueden indicar infecciones.

Cabeza y cuello → La cabeza del RN es muy vulnerable con el maldado que sufre durante el Peseje por el canal de parto.

- En la Presentación de vértice se espera alguna asimetría pero se resuelve en los primeros días de vida.
- Un calabazamiento o una distorsión de suturas (marcan en estudiosos).
- Depresiones o áreas de reblandecimiento del cráneo.
- El edema en los tejidos blandos y hematomas sobre la zona de presentación (caput succedaneum).
- Otro tipo de edema se observa por el cráneo (es cefalo hematoma) producto de la hemorragia entre el pericraneo y el hueso craneano.

Desarrollo del niño de 0 a 6 años

Desarrollo motor	Levantar la cabeza, Pront para el gateo	- Gateo - se pone de pie y algunos pasos	Andar, arrastrando objetos, saltitos	Aprender a montar en bicicleta o patineta
Cognitivo	Entiendo a estímulos visuales y sonoros.	Juego un juguete para aumentar su independencia.	Muestra más interés por los libros y juguetes.	Interés por el dibujo
Lenguaje	Se comunica con llanto y las sonrisas - balbuceo	Primeras palabras	Empezar a unir palabras pero se equivoca con frecuencia	El lenguaje es práctico más perfecto
Social	Dependencia de los padres y personas próximas	Más interés por los grupos	Un periodo de apego con sus padres y busca jugar con otros niños	La época del por qué y época de los dibujos.

Conclusión

En conclusión, el texto destaca la importancia del cuidado integral en la salud neonatal y pediátrica como una prioridad en la salud pública, especialmente en países en vías de desarrollo. Subraya cómo el diagnóstico y manejo adecuado del RCIU, junto con la evaluación integral del recién nacido mediante herramientas como el test de Apgar, la escala de Silverman y la de Capurro, permiten garantizar una adecuada adaptación y bienestar neonatal. Además, enfatiza la relevancia de estrategias preventivas como el esquema de vacunación en México, que reflejan el compromiso con la protección de la salud. Por último, se resalta el papel de la exploración física y el control nutricional en el crecimiento y desarrollo de los niños, constituyendo pilares fundamentales en la evaluación y promoción de la salud durante todas las etapas de la vida.