



Mi Universidad

Cuadro Descriptivo

Oswaldo Daniel Santiz Hernández

Enfermedades de Transmisión Sexual

Segundo Parcial

Sexualidad Humana


Dra. Dulce Melissa Meza López

Licenciatura en Medicina Humana



Tercer Semestre Grupo A

Comitán de Domínguez, Chiapas a 10 de abril de 2025


Enfermedades de Transmisión Sexual

Enfermedad y Clasificación	Imagen	Descripción	Dx	Tratamiento
Herpes Genital Viral HSV-1 o HSV-2		Transmisión: Contacto con lesiones o por diseminación asintomática. Período de incubación: 2 y 12 días. Mujeres: Pústulas en herpes genital primario, úlceras y vesículas en herpes genital recurrente. Hombres: Vesículas, ulceración generalizada debida a la coalescencia por infección grave. <i>Disuria, Tenesmo vesical, Retención urinaria.</i>	Anamnesis y examen físico. Cultivo, PCR	Aciclovir: 200 mg en 5 dosis por día 5 días. Valaciclovir 500 mg en una dosis 13 días. Famciclovir Dosis inicial de 250 mg 3 veces al día 5 días.
Vulvovaginitis Parasitaria: Tricomoniasis (<i>Gardnella vaginalis</i>). Fúngica: Candidiasis vaginal (<i>Candida albicans</i>). Bacteriana: Vaginitis bacteriana (<i>Gardnella vaginalis</i>).		Los síntomas son: comezón intensa, secreción vaginal blanquecina, gris, amarillenta e incluso verdosa que a veces puede tener mal olor. Flujo vaginal anormal. Disuria, Enrojecimiento o in. <i>20/1.</i>	PCR pH vaginal Microscopio en fresco	Aunque puede variar según los casos, se suele recetar: Antibiótico Antifúngico Hongos: Fluconazol 150 mg dosis única. Bacteriana: Metronidazol 500 mg c/12 por 7 días. Azitromicina 1gr dosis única.

Enfermedades de Transmisión Sexual

Enfermedad y Clasificación	Imagen	Descripción	Dx	Tratamiento
Sífilis Bacteriana Treponema Pallidum Subespecie Pallidum		Periodo de incubación de 21 días Sífilis Primaria: Se manifiesta como un chancro en el sitio de inoculación, una úlcera indolora con bordes definidos, solitario y asociado a linfadenopatía. Sífilis secundaria: Característicamente con una erupción generalizada de 4 a 8 semanas. Sífilis Terciaria: NEUROSIFILIS meningitis con o sin opacificación vascular, demencia, tabes dorsalis, opacificación ocular, GOMAS son lesiones nodulares y puede causar destrucción tisular, SÍFILIS CARDIOVASCULAR se manifiesta comúnmente como aortitis.	Anamnesis VDRL RPR Puebas	Penicilina G Benzatónica Penicilina G Benzatónica (Bicilina LA). Penicilina G Cristalina acuosa 2.4 millones de U IM 1 vez 2.4 millones de U IM semanales x 3 dosis.
Tricomoniasis Parasitaria Trichomonas Vaginalis		Secreción vaginal abundante de color gris, amarillento o verdoso con mal olor. Causa comezón, ardor intenso, disuria, dispareunia.	Examen Pético Hisopado Análisis de Orina Prueba de Papaniicola Examen de Fresco	Antibiótico (Metronidazol).

Enfermedades de Transmisión Sexual

Enfermedad y Clasificación	Imagen	Descripción	Dx	Tratamiento
Gonorrrea Bacteriana Neisseria Gonorrhoeae		Sin complicaciones: Uretitis, faringitis, y proctitis. Las infecciones asintomáticas son comunes en el canal endocervical en las mujeres y en los sitios faringeos y rectales tanto hombres como en mujeres. Complicado: Se extienden más allá del sitio primario de infección. Más frecuentes artritis, dermatitis; raramente endocarditis, meningitis. Disuria	Cultivo Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos	- Ceftriaxona 6500 mg IM en dosis única - Azitromicina + Gentamicina 2gr V.O en dosis única 240 mg IM en dosis única
Clamidia Bacteriana Chlamydia Trachomatis		Cuando aparecen pueden incluir secreción genital anormal y disuria. En mujeres puede causar dolor abdominal y sangrado entre periodos. Hombre: Dolor al orinar, descarga blanca que parece un hilo grueso blanco. Mujer: Dolor al orinar, descargas de mucosidad vaginal y dolor en el abdomen. Puede invadir el abdomen por el útero y produce endometritis, lo mismo en las trompas de Falopio. PID. Síntomas del PID son: dolor fuerte en el abdomen, fiebre, náusea, vómitos y cetacea.	Hisopado Muestras de Orina Cultivos Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos.	Antibióticos: - Ofloxacina - Doxiciclina - Azitromicina - Eritromicina

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antología Sexualidad Humana UDS
- Gutiérrez-Sandí, W., & Blanco-Chan, C. (2016). Las enfermedades de transmisión sexual y la salud sexual del costarricense Tema I. SIDA/VIH. *Revista Tecnología en Marcha*, 29(3), 117-131.
- Díaz, M, B, y Díaz, A (2011) ITS, Epidemiología y control revista española