



# UDS

## Mi Universidad

*Royer Obed Ramírez López*

*Abortos*

*Tercer parcial*

*Sexualidad Humana*

*Dra. Dulce Melissa Meza López*

*Licenciatura en Medicina Humana*

*Tercer Semestre*

# ABORTO

Interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del útero


## ABORTO TEMPRANO

Embarazo intrauterino no viable con un saco gestacional vacío o un saco gestacional que contiene un embrión o feto sin actividad cardíaca fetal de las primeras 12 semanas de gestación



## ABORTO TARDÍO

También conocido como aborto del segundo trimestre, se refiere a la interrupción del embarazo entre las 12 y 20 semanas de gestación



## ABORTO ESPONTÁNEO

Pérdida espontánea de un feto antes de la semana 20 del embarazo. Ocurre naturalmente, a diferencia de los abortos con medicamentos o procedimientos



## AMENAZA DE ABORTO

Es un estado de alerta que sugiere que puede ocurrir un aborto espontáneo antes de la semana 20 del embarazo. Ocasionalmente ocasiona sangrado vaginal




# ABORTO

Interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del útero

## ABORTO INEVITABLE

La mujer experimenta síntomas de pérdida del embarazo, el cuello uterino se dilata y el embarazo no puede continuar



## ABORTO INCOMPLETO

Los productos de la concepción no han salido completamente del útero. Es más probable que se produzca entre las semanas 8 y 14 de gestación



## ABORTO COMPLETO

Todo el contenido del útero, incluyendo el embrión o feto, placenta y los tejidos asociados, han sido expulsado completamente del cuerpo sin necesidad de intervenciones.



## ABORTO RETENIDO

También llamado aborto diferido ocurre cuando el embrión o feto ha muerto, pero no ha sido expulsado del útero de forma natural



# ABORTO

Interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del útero

## EMBARAZO ANEMBRIONADO

Se desarrolla el saco gestacional pero no el embrión.  
El saco esta presente dentro del útero, pero esta vacío



## ABORTO RECURRENTE O HABITUAL

El aborto de repetición, también llamado aborto recurrente, se define como la pérdida gestacional de 3 o más embarazos de las 20 semanas



## ABORTO INDUCIDO

Interrupción del embarazo con medicamentos o un procedimiento



## ABORTO SEPTICO

Infección grave de los contenidos uterinos durante o poco antes o después de un aborto



# ABORTO

Interrupción del embarazo  
antes de que el feto sea viable  
fuera del útero

## DX

Ecografía  
Manifestaciones clínicas  
Hisyeroscopia  
Medición de blets-hCG


## TX

Esperar que el cuerpo expulse el  
contenido  
Misoprostol  
Legrado uterino o aspiración manual  
endouterina (AMEU)



## ASISTENCIA EN AMEU Y LØ

ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA



LEGRADO UTERINO



## REFERENCIAS

- Zúñiga Fajuri, A. (2022). Aborto y derechos humanos. Revista de derecho (Valdivia)
- González de León Aguirre, D. (2020). El aborto en México.
- APA
- Roldán Peralta, J. A., & Siguenza Peñaloza, K. M. (2021). Tipos de aborto y factores asociados en mujeres de 15 a 45 años atendidas en emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso durante el 2020.