UDS

Mi Universidad

Infografia

Danessa Suquey Vázquez Alvarado

Infografía

Tercer parcial

Sexualidad humana

Dra. Meza López Dulce Melissa

Medicina humana

Tercer semestre

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de mayo del 2025

ABORTO

01. Definición

la Organización Mundialde la Salud (OMS) definen al aborto como la interrupción delembarazo antes de la semana 20 de gestación o el nacimiento de un feto que pesa menos de 500 g.

02. Tipos de aborto

Aborto habitual o recurrente

Tiene una frecuencia de aparición del 0.3%. Se define como la aparición de 3 o más abortos consecutivos, o más de 5 cuando se han tenido embarazos a término entre ellos.

03.

Aborto inducido (provocado) : Puede definirse como la interrupción de un embarazo por medio de una interversión quirúrgica o con medicamentos.

04.

Aborto Espontáneo

Es la pérdida espontánea de un feto antes de la semana 20 del embarazo. La pérdida del embarazo después de 20 semanas se llama muerte fetal.

05.

Aborto Séptico

Infección grave de los contenidos uterinos durante o poco antes o después de un aborto



06

Aborto retenido

Tambien llamado aborto diferido ocurre cuando el embrión o feto ha muerto, pero no ha sido expulsado del útero de forma natural

07

Aborto incompleto

Un aborto incompleto es aquel en el que los productos de la concepción no han salido completamente del útero.



08

Aborto completo

Todo el contenido del útero, incluyendo el embrion o feto, placenta y los tejidos asociados, han sido expulsado completamente del cuerpos

09 Técnica de evacuación uterina

AMEU: La aspiración manual endouterina o AMEU, es una técnica médica para retirar el contenido del útero a través del cérvix por medio de una cánula y una jeringa grande.

Indicaciones de AMEU:

- Aborto diferido de tamaño uterino menor o igual a 12 cm.
- En caso de mola hidatiforme, independientemente del tamaño uterino.
- Embarazo anembrionado y/o huevo muerto

Legrado uterino instrumental (LUI):

El legrado es una técnica empleada por los ginecólogos, que consiste en el raspado o curetaje de las paredes interiores del útero, con el fin de extraer y recoger la capa mucosa llamada endometrio.

Indicaciones del LUI

- Tratamiento del aborto incompleto con altura uterina equivalente a igual o menor a 22 cm de altura uterina.

10. Diagnostico

- Clínico: metrorragia, dolor.
- Examen ginecológico.
- Test de embarazo.
- Ecografía.

11. Tratamiento

CUADRO 6-8. Esquemas para la interrupción médica del embarazo durante el primer trimestre

Mifepristona/misoprostol

[a]Mifepristona, 100-600 mg por vía oral seguido de:
[b]Misoprostol, 200-600 µg por vía oral u 800 µg por vía vaginal entre 6 y 72 horas después

Metotrexato/misoprostol

[c]Metotrexato, 50 mg/m², por vía intramuscular u oral, seguido de:
[d]Misoprostol, 800 µg por vía vaginal entre 3 y 7 días después; repetir si es necesario luego de una semana del metotrexato inicial

Misoprostol aislado

800 µg por vía vaginal, repetir hasta tres veces

Bibliografia:

1. Díaz, E. F. (2020). El aborto terapéutico o cualquier tipo de aborto,¿ una cuestión de decisión personal en búsqueda de un bien? Secuelas psicológicas. UCV Hacer, 4(2), 142-146.
2. Roldán Peralta, J. A., & Siguenza Peñaloza, K. M. (2021). Tipos de aborto y factores asociados en mujeres de 15 a 45 años atendidas en emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso .