



Mi Universidad

cuadro descriptivo

Danessa Suquey Vázquez Alvarado

Cuadro descriptivo

Segundo parcial

Sexualidad humana

Dra. Meza López Dulce Melissa

Medicina humana

Tercer semestre

Clasificación	Descripción	Manejo
Gonorrrea (Bacterias)	<p>Los síntomas pueden aparecer entre los 2 a 7 días del contacto sexual genital, oral genital o rectal.</p> <p>Infección genital: Se caracteriza por secreción amarillenta y espesa junto con molestias al orinar.</p> <p>Infección faríngea (garganta): Suele ser asintomática pero puede presentar molestias faríngeas.</p> <p>Infección anorrectal: Puede haber secreción amarillenta, espesa con picor anal.</p>	<p>La gonorrrea se trata con cefalosporina o antibióticos del tipo quinolona.</p> <p>Tratamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única. - Azitromicina + Gentamicina 240 mg IM en dosis única.
Clamidia (Bacterias)	<p>Con frecuencia no produce síntomas. Si éstos aparecen se manifiestan entre 7 y 21 días tras el contacto sexual.</p> <p>Varón: Secreción clara y transparente acompañada de molestias al orinar (uretritis no gonocócica).</p> <p>Mujer: aumento de flujo, alteraciones de la regla o sangrado tras la relación sexual.</p>	<p>Antibióticos como la azitromicina o doxiciclina.</p>
Virus del Papiloma Humano (VPH)	<p>Puede aparecer entre 1 y 20 meses del contacto sexual. En los órganos genitales, anales o orales, unas lesiones irregulares, verrugosas con aspecto de coliflor.</p>	<p>El uso del condón reduce considerablemente la probabilidad de contraer VPH.</p> <p>Tratamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vacuna cuadrivalente protegida contra dos tipos (6 y 11). - Vacuna nonavalente añade contra 5 tipos (31, 33, 45, 52 y 58).



Clasificación	Descripción	Manejo
Hepatitis B (virus)	La transmisión se puede producir vía parenteral (transfusiones, uso compartido de jeringuillas o material de inyección, tatuajes) y sexual.	Tratamiento: * Medicamentos antivirales * Inyecciones de interferón * Trasplante de hígado.
Candidiasis vulvovaginal (hongos)	Causada por un tipo de hongo (normalmente <i>Candida Albicans</i>). Los síntomas más frecuentes incluyen picor importante y secreción vaginal de color blanco y espesa (parecida al requesón).	Fluconazol (oral) 150 mg dosis única.
Trichomonas vaginalis (hongos)	El flujo vaginal puede ser espumoso, olor mal y aparece con sangre.	Tratamiento: - Metronidazol 2g vía oral (500 mg cada 12 h por 7 días) - Tinidazol 2g vía oral.



Fuente:

- Diez, M., & Díaz, A. (2011). Infecciones de transmisión sexual: epidemiología y control. Revista Española de Sanidad.