

ABORTO Y TIPOS DE ABORTO

**ALEJANDRO GARCIA GARCIA
SEXUALIDAD HUMANA
TERCER PARCIAL
DRA. MEZA LOPEZ DULCE MELISSA
TERCER SEMESTRE
GRUPON A**

ABORTO Y TIPOS DE ABORTO

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el aborto se define como:

“La interrupción del embarazo cuando el feto aún no es viable fuera del útero materno, es decir, antes de las 22 semanas de gestación o con un peso fetal menor de 500 gramos.”

Aborto Temprano

La pérdida temprana del embarazo se define como un embarazo intrauterino no viable con un saco gestacional vacío o un saco gestacional que contiene un embrión o feto sin actividad cardíaca fetal dentro de las primeras 12 6/7 semanas de gestación



Aborto Tardío

También conocido como aborto del segundo trimestre, se refiere a la interrupción del embarazo entre las 12 y las 20 semanas de gestación




Aborto Espontáneo

Es la pérdida espontánea de un feto antes de la semana 20 del embarazo. La pérdida del embarazo después de 20 semanas se llama muerte fetal. Un aborto espontáneo es un suceso que ocurre naturalmente, a diferencia de los abortos con medicamentos o procedimientos de aborto



Aborto inevitable

Es un tipo de aborto espontáneo donde, a pesar de que la mujer experimenta síntomas de pérdida del embarazo, el cuello uterino se dilata y el embarazo no puede continuar



Aborto incompleto

Un aborto incompleto es aquel en el que los productos de la concepción no han salido completamente del útero. Es más probable que se produzca entre las semanas 8 y 14 de gestación



ABORTO COMPLETO



Aborto completo

Todo el contenido del útero, incluyendo el embrión o feto, placenta y los tejidos asociados, han sido expulsado completamente del cuerpo sin necesidad de intervenciones médica o quirúrgica adicional

ABORTO Y TIPOS DE ABORTO



Aborto retenido

Aborto retenido

También llamado aborto diferido ocurre cuando el embrión o feto ha muerto, pero no ha sido expulsado del útero de forma natural

Embarazo anembrionado


Se desarrolla el saco gestacional pero no el embrión. El saco está presente dentro del útero, pero está vacío



Embarazo anembrionario

Aborto Recurrente o habitual

El aborto de repetición, también llamado aborto recurrente, se define como la pérdida gestacional de 3 o más embarazos antes de las 20 semanas.



Aborto inducido

Interrupción del embarazo con medicamentos o un procedimiento



Aborto Séptico

Infección grave de los contenidos uterinos durante o poco antes o después de un aborto



Diagnostico

- Historia clínica (sangrado vaginal, dolor abdominal, pérdida de síntomas de embarazo).
- Examen pélvico.
- Ecografía transvaginal: para confirmar presencia o ausencia del embrión y actividad cardíaca.
- Niveles de hCG en sangre: para evaluar la evolución del embarazo.

Tratamiento

- Expectante: se espera la expulsión natural del producto (si no hay complicaciones).
- Farmacológico: misoprostol para acelerar la expulsión.
- Quirúrgico: AMEU o legrado si hay restos retenidos, sangrado abundante o infección.

Referencia Bibliografica

Zúñiga Fajuri, A. (2022). Aborto y derechos humanos. Revista de derecho (Valdivia)

González de León Aguirre, D. (2020). El aborto en México.

Roldán Peralta, J. A., & Siguenza Peñaloza, K. M. (2021). Tipos de aborto y factores asociados en mujeres de 15 a 45 años atendidas en emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso durante el 2020.