

UUDS

Mi Universidad

Alejandro García García

Cuadro Descriptivo

Segundo Parcial

Sexualidad Humana

Dra. Meza López Dulce Melissa

Lic. Medicina Humana

Tercer Semestre



Comitán de Domínguez Chiapas ha 09 de Abril de 2025

Clasificación Infecciones de Transmisión Sexual ITS

-Transmisión Por fluidos

- Chlamidia
- Gonorrea
- VIH
- Hepatitis A, B, C
- Tricomonas
- Sífilis

-Transmisión Piel con Piel


- VPH
- Herpes
- Sífilis
- Candidiasis
- Molusco contagioso
- Sarna
- Ladillas.

CASIFICACION

Descripción

Manejo de atención

-Gonorrhea → bacteria Neisseria Gonorrhoeae.



Chlamidia



Gonorrhea



Sifilis

Gonococo con blenorragia, vía de contagio sexo vaginal, anal

Síntomas que puede provocar la enfermedad inflamación peritoneal.

Si no se trata dado lugar a la interinidad.

Tratamiento de Elección, no complicada (uretra, cervix, recto, faringe)

• Ceftriaxona 500 mg IM dosis única

+ Tratamiento Empírico para chlamydia trachomatis. Doxiciclina 100 mg VO.

- Sarna o escabiosis

Parasitos



Eruzión genital



Picor genital

Es una afección de la piel que es causada por parásitos los ácaros de la sarna.

La sarna provoca erupciones irritación y mucha picazón.

Se realiza la transmisión piel con piel.

• Topico - Permetrina 5% crema

• Sistémico - Ivermectina Oral

Ivermectina 200 mcg/kg VO en dosis única.

• Tratamiento Complementario.

Lavar ropa, sábanas con agua caliente y secar al calor.

Sifilis → bacteriana

Treponema Pallidum.

Es una infección grave bacteriana si no se trata de forma temprana

Su principal síntoma es la aparición de unas llagas en el área genital llamadas chancres los cuales son muy contagiosos.

Tratamiento de elección en todas las formas.

Penicilina G benzatina


2.4 millones de unidades IM

(1.2 millones cada glúteo)

Clasificación

VPH

- **Viros del papiloma humano**



Virus del papiloma humano (VPH)

Herpes Genital

Causada por el **viros del herpe simple (VHS)**

- Herpes simple T1 VHS-1
- Herpes simple T2 VHS-2



Descripción

Es una enfermedad de transmisión sexual más común que existe.

Existen unos 40 tipos de VPH que afecta a los genitales tanto como hombres y mujeres.

El VPH provoca aparición de lesiones en la piel conocidas como **verrugas genitales**.

Casos más graves, pueden provocar cáncer.

Se caracteriza por la aparición de lesiones en la vulva, la vagina, el cuello uterino, el ano, el pene, escroto, nalgas, cara interna de los muslos.

Ambas tipos pueden darse lugar al herpes genital, aunque es más común que el agente causal sea el VHS-2.

Manejo de atención

la **prevención**, la **detección** de cambios celulares anormales y el **tratamiento**.

Prevención: Vacunarse, condón, educación sexual

Tratamiento:

Eliminar las células anormales causadas por el VPH

Tratar verrugas genitales

- Medicamento antivirales

Aciclovir, valaciclovir, famaciclovir.

Primer Episodio:

Aciclovir 400 mg VO cada 8 horas por 7-10 días.

Brotes recurrentes:

Aciclovir 800 mg VO cada 8 horas por días.

Referred Bibliography

Wong A. Acute chapter in HIV prevention
the Lancet 2011; 367 (9977): 108

CDC Center for Disease control and prevention 2011. Sexually transmitted disease. STD