



**Mi Universidad**

**ETS**

*Amanda Eugenia Torres Zamorano*

*Parcial II*

*Sexualidad Humana*

*Dra. Dulce Melissa Meza López*

*Medicina Humana*



*Tercer Semestre*

*Comitán de Domínguez, Chiapas A; 10 de abril de 2025*

## Enfermedades de Transmisión sexual más comunes en México

ENFERMEDAD	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	ILUSTRACIÓN
VULVOVAGINITIS	<p>Bacteriana: Gardnerella Vaginalis.</p> <p>Fúngica: Candida Albicans</p> <p>Parasitaria: Trichomonas vaginalis</p>	<p>Los síntomas son: comezón intensa, secreción vaginal blanca, gris amarillento e incluso verdoso que a veces puede tener mal olor.</p>	<p>Aunque puede variar según los casos, se suelen recetar: Antibiótico. Antifúngico.</p>	
TRICOMONIASIS	<p>Parasitaria Trichomonas Vaginalis.</p>	<p>Secreción vaginal abundante de color gris, amarillento o verdoso con mal olor. Causa comezón, ardor intenso, dolor al orinar y durante las relaciones sexuales.</p>	<p>Antibiótico Metronidazol</p>	
CLAMIDIALIS	<p>Bacteriana Chlamydia Trachomatis</p>	<p>Algunas ocasiones no presentan síntomas.</p> <p>Hombres: ardor al orinar y una descarga blanca hilo grueso blanco.</p> <p>En las mujeres: ardor al orinar, una descarga de mucosidad Vaginal y dolor</p>	<p>Tratada con alguno de los siguientes Antibióticos: Ofloxacin (pre-ferido), doxycycline, azithromycin, erythromycin.</p>	<p>CHAMYDIA</p> 

## Enfermedades de Transmisión sexual más comunes en México

ENFERMEDAD	CLASIFICACION	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	ILUSTRACION
CLAMIDIALIS	Bacteria Chlamydia Trachomatis	En el abdomen. Puede invadir el abdomen por el útero y producir endometritis, lo mismo en las trompas de falopio (salpingitis). Cuando ocurre, puede desarrollar una infección inflamatoria pélvica (PID) que puede producir infertilidad. Síntomas del PID son: dolor fuerte en el abdomen, fiebre, náusea, vómitos y dolores de cabeza.	PID requiere un tratamiento más agresivo que envuelve la administración intravenosa de antibióticos, normalmente por 10 días en un hospital.	
GONORREA	Bacteriana Neisseria: Gonorrhoeae	En los hombres son: orinar frecuente y con mucho ardor (disuria) y descarga espesa de pus por el pene.	Una inyección ceftriaxona intramuscular o 500mg de ciprofloxacina oral.	

CS Escaneado con CamScanner

## Enfermedades de Transmisión sexual más comunes en México

ENFERMEDAD	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	ILUSTRACIÓN
GONORREA	Bacteriana Neisseria Gonorrhoeae	En la Mujer el cervix es el más afectado	Una inyección ceftriaxona intramuscular ó 500 mg. de ciprofloxacina oral.	
SIFILIS	Bacteria Treponema Pallidum	<p>Primaria: Se manifiesta como un chanco en el sitio de inoculación, una úlcera indolora con bordes definidos, solitario y asociado a linfadenopatía regional.</p> <p>Secundaria: Erupción generalizada de 4 a 8 semanas después del inicio de la primaria. Típicamente la erupción es maculopopular ó papuloescamosa y no pruriginosa.</p> <p>Terciaria: Neurosífilis, meningitis, demencia, goma, destrucción tisular, sífilis cardiovascular.</p>	<p>Sífilis primaria y secundaria:</p> <p>Penicilina G Benzatínica (Bicilina LA)</p> <p>Sífilis Terciaria</p> <p>Penicilina G Benzatínica.</p>	

## Bibliografía

- Diez, M., & Diaz, A (2011). Infecciones de transmisión sexual: epidemiología y control. Revista española de sanidad.