



**Universidad del sureste
Campus Comitán**

**Licenciatura en Medicina Humana
Cuadro comparativo**

Dra: Dulce Melissa Lopez

Maggie Yahaira López Jimenez

PASIÓN POR EDUCAR

Tercer semestre

Grupo "A"

Sexualidad Humana

Agente causal



(VPH)

Virus del papiloma humano (VPH)

Via de transmisión

se transmite al contacto directo piel con piel. Infección de transmisión sexual a través de las relaciones sexuales

Cuadro clínico

pequeños bultos asépticos urogenitales genitales en la vagina o el pene. las verrugas son dolorosas y causan prurito y sangrado

Complicaciones

- Cáncer cervical
- Cáncer de ano
- Cáncer de vagina
- Cáncer de pene

Prevención


Actualmente existen vacunas para la prevención del virus. usar anticonceptivos condados tipo de condado de VPH

Diagnóstico

Realizan una vez al año citología vaginal o el test de cribado de VPH

Tratamiento

- Retiour dosis alta de Boog 5 veces al día durante 15 días
- Panecloaur 300mg 3 al día
- Ustactour loomg 2 veces al día durante 10 días



virus del herpes simple tipo 1 y 2

contacto sexual con persona infectada a través de las relaciones sexuales se transmite a través de la membrana mucosa de la piel

Presencia de ampollas en una base herpetiforme en zona genital que se rompe dando lugar a llagas dolorosas durante costras.

- Infecciones en los órganos internos
- Infecciones en recién nacidos
- Propagación de herpes a otras partes del cuerpo

abstinencia sexual usar correctamente preservativos durante las relaciones sexuales

- PCR
- Frotiz de Tzanem
- Cultivo viral
- Pruebas directas de anticuerpos



Candidiasis

[Handwritten signature]

la candidiasis se transmite de forma directa con la zona infectada durante las relaciones sexuales.

corazón, salpicados en la zona afectada amolecimiento o hinchazón de la vulva flujo vaginal anormal secreción blanca

- Vulvovaginitis
- candidiasis
- candidiasis cutánea
- candidiasis bucal

Mantener una buena higiene, no utilizar ropa ajustada llevar una dieta saludable evitar dietas vaginales.

una prueba de cultivo fungico.

Fluconazol loomg 150mg o 200mg por via bucal una sola dosis



Neisseria gonorrhoea

Principalmente a través de las relaciones sexuales sin protección o de madre a hijo durante el parto

- Dolor arroy al orinar
- secreción del pene o vagina
- salpicado
- llagas en piel
- Dolor articular

enfermedades inflamatoria pélvica enfermedad estroica o estenoidad inflamatoria genital

utilizando adecuadamente el condon tanto femenino como masculino o realizando pruebas de detección

- Analisis de orina
- Hisopado
- Tinción de gram
- cultivo
- PCR

- Ceftriaxona 500mg en una sola inyección
- Doxiciclina loomg dos al día por oral dura 7 días



bacteria chlamydia trachomatis

se transmite principalmente al tener relaciones sexuales no protegido incluyendo sexo anal

- Flujo vaginal
- sangrado después de las relaciones
- Dolor abdominal
- arroy al orinar
- Testículo adolorido o hinchado

enfermedad pélvica infección en los testículos Artritis reactiva Riesgo de contraer VIH

utilizar condones de latex puntualmente cada vez que tengas relaciones sexuales vaginales anales o orales higiene íntima

analisis de laboratorio

Referencia bibliográfica

- Diez, M. B., Diaz, A. (2011). Infecciones de transmisión sexual epidemiología y control. Revista española de sanidad.