



**Universidad del sureste  
Campus Comitán  
Licenciatura en Medicina Humana**

**Tema: Apendicitis Aguda**

**Nombre del alumno: Antonia Berenice Vázquez Santiz**

**7° "A"**

**Materia: Clínicas Quirúrgicas complementarias**

**Dr. Morales Domínguez Alan de Jesus**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 3 de marzo del 2025**

# EPENDICITIS AGUDA

## PARACLINICO

- EGO (Mujeres en edad fértil)
- Proteína C reactiva >10mg/L
- BH > Leucocitosis > 10,000

## PRESENTACION CLINICA

- Triada de Murphy
- Dolor abdominal
  - Fiebre y anorexia
  - Náuseas- vómito
  - Dolor de FID

## DX DIFERENCIAL

- Diverticulitis
- Epi
- Torsión ovarica
- ITU
- Embarazo ectópico
- Gastroenteritis

- TAC → Gold standar: Tiene una sensibilidad de 84 a 92% y especificidad de 90 a 100%
- RM
- USG

## ESCALAS

<b>síntomas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migración de dolor</li> <li>• Anorexia</li> <li>• Náusea/vómito</li> </ul>	1 1 1
<b>signos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor cuadrante inf</li> <li>• Rebote(+)</li> <li>• Fiebre</li> </ul>	2 1 1
<b>Lab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leuco</li> <li>• desviación a la izq. de neutrófilos</li> </ul>	2 1 total: 10

## SINTOMAS

- Vómito y /o náuseas
- Anorexia
- Dolor abdominal tipo cólico periumbilical que migra a FID.

## SIGNOS

- Fiebre 38°, taquicardia, disminución de la peristalsis
- Datos de irritación peritoneal (hiperestesia, rigidez abdominal, hiperalgesia, rebote (+))

## EXPLORACION FISICA

- punto de McBurney, signo de Rovsing
- signo de psoas
- signo del obturador, signo de Summer
- signo de von Blumberg, signo de talopercusión, signo de Dunphy

- **El signo de Rovsing:** es un dolor en el lado derecho del abdomen que se produce al palpar el lado izquierdo. Es un hallazgo clínico que indica apendicitis aguda.
- **Signo de McBurney:** que se encuentra a dos tercios de la distancia entre el ombligo y la espina iliaca anterosuperior derecha.
- **El signo del psoas:** es un dolor que se produce al flexionar o elevar la pierna contra la presión de una mano.
- **El signo del obturador:** es un dolor que se produce al rotar interna y externamente la cadera mientras el muslo está flexionado.

## Manejo

Apendicetomía laparoscópica o abierta

## Tratamiento

**Preoperatorio:**  
Antibioticoterapia con cefalosporinas de 2ª generación (cefocetan o cefoxitina) + aspiración por sonda nasogástrica

**Tx quirúrgico:**  
Apendicetomía laparoscópica + drenaje de abscesos apendiculares (en caso de estar abscedado)