



Apendicitis aguda

Alexa Avendaño Trujillo

Mapa conceptual

7 "A"


Clínicas quirúrgicas complementarias

Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez

Comitán de Domínguez Chiapas

03 de marzo 2025

APENDICITIS AGUDA



Clínica

- Dolor en epigastrio FID
- Fiebre > 38
- Síntoma y signo
- Anestesia

TEJIDO DE MUYOY

- Fiebre > 38
- Dolor en epigastrio FID
- Síntoma y signo

Signos especiales

SIGNO DE ROBERT

Dolor al toser

SIGNO DE BLUMBERG

Presión gradualmente en FID del abdomen, liberando la presión bruscamente (PERKINS)

SIGNO DE MC BRIDEY

Dolor directo trasladado entre la línea media inguinal, desde la espina ilíaca superior a la cicatriz umbilical entre el primer mesio.

MAYORIAS DE TAYLORPETERSON

Perforación del tórax derecho

SIGNO DE RIVEROG

Presión en FID, al soltar cede el dolor en FID

SIGNO DE PINKS

Palpación en abdomen dorsal, levantar pierna derecha elevando presión.

Peritoneales

Biometría hemática

Leucocitosis > 12 mil a expensas de neutrófilos.

Batimetría de tórax y abdomen

SIGNO DE SIEMM: Aplanado en forma de abanico con un diámetro > 6 cm

Systemic

ALIVIANO

signo

- Síntoma**
 - Mayoría de dolor > 4
 - Anestesia > 1
 - Anestesia > 1
- Signo**
 - Dolor en FID > 12
 - Dolor positivo > 1
 - Fiebre > 1
- Laboratorio**
 - Leucocitosis > 12
 - Desviación a la izquierda de neutrófilos > 1

9-30: Escal variable
35: Alta probabilidad
8-25: Examen pero no da
4: Baja probabilidad

ESTRESA

signo

- Dolor**
 - Mayor > 1
 - Mayor > 1
 - < 10 días > 1
 - < 10 días > 1
 - Escalera > 1
- Síntoma**
 - Dolor en FID > 12
 - Mayor > 1
 - Mayor > 1
 - Mayor > 1
 - Síntoma > 10 > 1
 - Síntoma > 10 > 1
- Signo**
 - Mayoría de FID > 12
 - Batimetría anormal > 1
 - Mayor > 1
 - Mayor > 1
 - Mayor > 1
- Laboratorio**
 - Leucocitosis > 12
 - ESR negativo > 1

30: Inapetencia
2-2: Baja probabilidad
2-2: Alta probabilidad
12: De defecación, sensación por escape

Alivio

APENDICITIS LATENTE

Recomendar en 1-2 semanas

APENDICITIS ABIERTA

Bajar las complicaciones postoperatorias de infección de la parte del tubo paratúbulo en niños

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

Colocación de 10 en momento de la colocación anestésica

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

Colocación de 20 en anestesia 500 mg 10 30