



UDRS

Mi Universidad

Ermin De Jesus Reyes Lopez

Antibióticos

Parcial II


Terapia Farmacológica

DR. Bryan Adolfo Medellín Guillén

Medicina Humana

Cuarto semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas, a 27 de mayo de 2025



Paciente masculino de 9 años acude por odinofagia, fiebre de 38.8 °C, halitosis y placas blanquecinas en amígdalas. No presenta tos. En la exploración se encuentra hiperemia faríngea y ganglios cervicales dolorosos.

1. ¿Qué agente etiológico es más probable?
 1. *Streptococo* Beta hemolítico, cumpliéndose los criterios clínicos de centor
2. ¿Es necesario solicitar prueba rápida o cultivo?
 1. No, porque ya tenemos los criterios cumplidos y se puede inicial tratamiento
3. ¿Qué antibiótico está indicado y por cuánto tiempo?
 1. Se puede usar Amoxicilina 50 mg/kg/día en una sola dosis o dividida cada 12 h, por 10 días
 2. Aunque también se puede autolimitar sola
4. ¿Qué complicaciones puede haber si no se trata?
 1. Absceso periamigdalino
 2. Otitis media
 3. Sinusitis
 4. Linfadenitis cervical supurativa

Bibliografía

Katzung, B. G. (Ed.). (2019). *Farmacología básica y clínica* (14.^a ed.). McGraw-Hill Education / Interamericana Editores.