



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
MEDICINA HUMANA
CAMPUS COMITAN**



TEMA:
ENFERMEDADES EXANTEMATICAS

MATERIA:
CRECIMIENTO Y DESARROLLO BIOLOGICO

ALUMNA:
DANIELA ELIZABETH CARBAJAL DE LEÓN

GRADO Y GRUPO:
SEPTIMO "A"

DOCENTE:
DRA. IRIS MAYELA TOLEDO LOPEZ

Enfermedades exantemáticas

Enfermedad	Etiología	Edad / Especie	Exantema característico	Síntomas	Diagnóstico	Tratamiento
1. Sarampión	Virus del sarampión (Fam: Paramyxoviridae) (Género: Morbillivirus) * Incubación: 10 días	Preescolares Invierno Primavera	Manchas, Koplik Puntos de Herman Líneas de Stimson	Tos, fiebre, erupción conjuntivitis, exantema maculoso papular	Clinico Serología IgM Burbujas faringicas	Sintomático Vitaminas A Masuna SAB (Bou)
2. Varicela	Virus varicela zoster (Fam: Herpes virus 3) * Incubación: 10-21 días	< 10 años ↑ inmunidad: lata Primavera / Invierno < 1 año, 1-4 años adolescentes Invierno Primavera	Úlceras "teja de rojo" En distintos estadios (mácula, pápula, vesícula, costra) Manchas de Forche inter Maculoso papular resaca	Prurito intenso, fiebre, molestias genitales Fiebre, adenopatías relacionadas suboculares	Clinico Cultivos o EUSA Tinción Tzanck Cinico PCR o EUSA Serología IgM	Sintomático Aciclovir 5-7 días Vacunación (Shen) Sintomático
3. Rubéola	Virus de la rubéola (Fam: Togaviridae) (Género: Rubivirus) * Incubación: 14-20 días	Virus de la rubéola (Fam: Togaviridae) (Género: Rubivirus) * Incubación: 14-20 días	Manchas "pápula de rojo"	Fiebre, adenopatías relacionadas suboculares	Clinico Cultivos o EUSA Tinción Tzanck Cinico PCR o EUSA Serología IgM	Sintomático Aciclovir 5-7 días Vacunación (Shen) Sintomático
4. Escarlatina	EBHGA * Incubación: 1-7 días	3-15 años Invierno Primavera	Exantema rojo difuso "en lija" Signos de Berta Lengua en fresa Triángulo Filatov	Fiebre, adenopatías relacionadas suboculares	Clinico Cultivos o EUSA Tinción Tzanck Cinico PCR o EUSA Serología IgM	Sintomático Aciclovir 5-7 días Vacunación (Shen) Sintomático
5. Enteria infecciosa	Parvovirus B19 * Incubación: 4-21 días	5-17 años Brote cada 3-4 años	"Puntillas absortidos" Exantema reticulado en trono y extremidades Manchas "pápula de rojo"	Síntomas leves, resaca relacionados suboculares	Clinico Serología IgM PCR	Sintomático Aciclovir 5-7 días Vacunación (Shen) Sintomático
6. Exantema subto	Herpes virus 6 * Incubación: 5-15 días	< 3 años Guarderías Estacional	Manchas "pápula de rojo"	Fiebre, adenopatías relacionadas suboculares	Clinico Serología IgM PCR	Sintomático Aciclovir 5-7 días Vacunación (Shen) Sintomático
7. Enfermedad Kawasaki	Desconocido	< 5 años Varones Invierno	Exantema Maculoso papular Lengua en fresa	Fiebre ≥ 5 días, conjun- tivitis bilateral, linfa- denopatía, desproporcion Exantema diverso	Clinico Vista PCR Plasquet EKG Criterios Dx	Sintomático Aciclovir 5-7 días Vacunación (Shen) Sintomático
8. Pic-Primo- Roca	Enterovirus (Coxsackievirus B6, B7, B11, y otros) * Incubación: 2-14 días	6m-13 años Verano / Invierno Tropical	Úlceras o vesículas que se ulceran en paladar blando, amígdalas, uvula	Fiebre, erupción, adenop- atías, dolor abdominal Prurito o puede ser asintomático	Clinico PCR	Sintomático Aciclovir 5-7 días Vacunación (Shen) Sintomático
9. Herpesina	Enterovirus (Coxsackievirus A)	Niños pequeños Verano	Úlceras o vesículas que se ulceran en paladar blando, amígdalas, uvula	Fiebre, adenopatías relacionadas suboculares	Clinico PCR	Sintomático Aciclovir 5-7 días Vacunación (Shen) Sintomático

Bibliografía

- Kliegman, R. M., St. Geme, J. W., Blum, N. J., Shah, S. S., Tasker, R. C., & Wilson, K. M. (2020). Nelson tratado de pediatría (21.^a ed., Vol. 1 y 2).
- Instituto Mexicano del Seguro Social. (2012). Diagnóstico diferencial de los exantemas infecciosos en la infancia (IMSS-588-12). Guía de Práctica Clínica.