



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Yari Karina Hernández Chacha

Parcial : 4to parcial

Nombre de la Materia: Ginecóloga y obstetricia

Nombre del profesor: Fernández Solís Citlali Berenice

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana.

7 Semestre Grupo A



Definición

Es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de este.

Tipos

Pregestacional > Dx Antes de la semana 13.

1) DBG > Dx semana Ester 24-28.

Factores de riesgo

Edad materna > 35 años
IMC > 30
Historia previa de diabetes gestacional
Historia familiar de diabetes
Macrosomía



Clinica

Polidipsia
poliuria
vision borrosa
fatiga
pérdida de peso



Epidemiologia

7% de embarazos a nivel mundial
(>200 mil casos al año)

MEXICO: Prevalencia 8.7% a 17.7 %

Mujer mexicana pertenece a grupo étnico de alto riesgo

>90% embarazos que se complican por diabetes, es por Diabetes gestacional



Diagnóstico

5) GLUCOSA PLASMÁTICA EN AYUNO (TODA EMBARAZADA < 13SDG)

92 - 126mg/dl - realizar curva de tolerancia a la glucosa CTG, Hb1ac o nueva glucosa en ayuno (solo si no se cuenta con CTG o Hb1ac)

ALGUN VALOR DE CTG ESTA ALTERADO ES DB PREGESTACIONAL

Diagnóstico

Realizar glucosa plasmática en ayuno 1ra consulta prenatal o <13 SDG a toda mujer embarazada para detección temprana de DM2 no DX.

Mujer embarazada 1er trimestre con alt. De glucosa en ayuno realizar CTG oral con carga 75gr, nueva glucosa en ayuno o HbA1c.

Tamizaje universal a toda mujer con riesgo bajo a moderado entre 24-28 SDG



Tratamiento

1ra línea Insulina de inicio

Iniciar cuando: la dieta y el ejercicio no logran las cifras meta en un periodo de 2 semanas

Paciente diabéticas que usan metformina: No suspender

