



Universidad del sureste
Medicina humana



Trabajo:
Cuadro Comparativo

Nombre del alumno:
Monjaras Hidalgo Hugo de Jesus

Grado y Grupo
7 "A"

Materia
Ginecología y Obstetricia
Docente:
Dra. Citlali Berenice Fernandez Solís

Comitán de Domínguez Chiapas a 27 de mayo del 2025

CUADRO COMPARATIVO

Cervic: vaginitis

	Vaginosis bact.	Candidiasis	Tricomoniasis
Definición	Infección bacteriana producida por la flora vaginal saprofita normal por altas concentraciones de <u>Gardnerella vaginalis</u> etc.	Infección del epitelio estratificado de la vagina y el vestíbulo, ocasionado por levaduras oportunistas del género <u>Candida</u> .	Inflamación de la mucosa vaginal causada generalmente por hongos y protozoario por <u>trichomonas vaginalis</u> .
Cuadro Clínico	- Leucorrea o flujo vaginal blanco/gris <u>Olor a pescado</u> - Indurado, sin comezón o irritación	<u>Queso Cottage</u> - Eritema - Inflamación vulvovaginal - Molesta al orinar.	<u>Cuello uterino en fresa</u> - Dolor al tener relaciones. - Dolor pélvico bajo - Flujo anormal o leucorrea.
Factores de riesgo	- Duchas vaginales - Reciente cambio de pareja sexual - Anticonceptivos hormonales - Cunnilingus receptivo.	- Obesidad - Anticonceptivo oral. - Diabetes descontrolada.	#Parejas sexuales.
Diagnóstico	- Dx inicial clínico - Confirmatorio frotis de exudado vaginal y criterios de <u>Nugent & Amsel</u> o criterios de <u>Hay/Ison</u>.	- Dx inicial clínico - Flujo vaginal sin dor <u>Cultivo de levadura</u> (estándar de oro)	- Cultivo. - Detección frotis en fresco
Tratamiento.	Metronidazol VO 400-500 mg 2 veces/día x 7 días.	Miconazol crema 2%, una aplicación (Sgr) en vulva y vaginal /día x 7 días.	Metronidazol VO 800mg 2 veces/día x 7 días.