




Mi Universidad

Cuadro comparativo

Nombre del Alumno: Xóchitl Monserrath Jiménez del Agua y Culebro

Nombre del tema: Cervicovaginitis

Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia

Nombre del docente: Citlali Berenice Fernández Solís.

Séptimo Semestre

Comitán de Domínguez Chiapas, a 27 de mayo del 2025

Cervicovaginitis

	Vaginosis bacteriana	Candidiasis	Trichomonas
Definición	Infección vaginal caract. por un desequilibrio en la flora bacteriana normal de la vagina. Infec. vaginal sin respuesta inflamatoria. Los lactobacilos predominantes son remplazados por bacterias anaerobias como Gardnerella.	Infección del epitelio estrógeno-genizado de vagina y vulva, por candida (flora normal), que puede volverse patógeno bajo ciertas condiciones, como humedad, calor, maceración crónica, fricción, embarazo, DM.	Infección causada por el protozoo Trichomonas vaginalis.
Cuadro clínico	50% asintomática - Flujo o leucorrea vag. - Fluido blanco y grisáceo - Fetidez y olor a pescado - Sin dolor, comezón, picazón e irritación.	- Inflamación vulvovaginal - Fisuras - Secreción adherente a la mucosa blanquesina con grumos (queso cottage). - Eritema o enrojecimiento - Pruriginosa - Molestia al orinar.	- Flujo anormal o leucorrea amarillenta abundante, espumosa, gaseosa - Dispareunia - Fetidez - Disuria - Edema vaginal - Signo de cervix en fresa
Factores de riesgo	- Lavado vaginal - Raza negra - Cambio de pareja sexual - Tabaquismo - Uso de anticonceptivos hormonales - Presencia de ITS	- Diabetes descontrolada - Uso de anticonceptivos orales. - Obesidad - Uso de corticoesteroides - Quimioterapia - Px inmunocomprometido	- Cambio de pareja o múltiples parejas sexuales en el último año. - Relaciones sexuales sin protección
Diagnóstico	CLÍNICA. - Flujo o leucorrea vaginal - Fetidez y olor a pescado.	Tx tópico - Miconazol crema 2%, 1aplic 5gr en vulva y vag. al día x 7d - Nistatina óvulos o tabletas vaginales de 100mil UI 1c/24h x 14 días. TX ORAL - Fluconazol cápsula 150mg en dosis única o Itraconazol 200mg c/12h x 7 días	- Detección de frotis en fresco (para flagelado). - Ph vaginal > 4.5 - Microscopia (5:60%) - Cultivo de Diamond's
Tratamiento	- Metronidazol 400 - 500mg VO - Metronidazol 2g VO DU - Metronidazol local vag. x 5 días.	- Frotis en fresco - levadura pseudomixas - Tinción de gram - Estudio citológico cervico-vaginal. - Cultivo → Est. confirmatorio	- Metronidazol oral 500mg c/12hr por 7 días. - Metronidazol oral 2gr DU. - TX ALTERNATIVO - Tinidazole 2gr en DU.