



Mi Universidad

Cuadro Comparativo

Nombre del Alumno: Orlando Gamaliel Mendez Velazco

Nombre del tema: Cervicovaginitis

Parcial: Tercer Parcial

Nombre de la Materia: Clínica de Ginecología y Obstetricia

Nombre del Docente: Dra. Citlali Berenice Fernández Solís

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Séptimo Semestre

Cervicovaginitis

	Vaginosis Bact.	Candidiasis	Trichomonas
Definición	Inflamación de la mucosa vaginal, cuyo principal agente son las bacterias. (<i>Gardnerella vaginalis</i>).	Inflamación de la mucosa vaginal, cuyo principal agente son los hongos (<i>Candida Albicans</i>).	Inflamación de la mucosa vaginal cuyo principal agente son protozoarios (<i>Trichomona vaginalis</i>).
Factores Riesgo	- Lavado vaginal (Duchas). - Raza negra - Cambio de Pareja Sexual - Presencia de ITU - Uso de Anticoncept. Hormonales.	- Lavado vaginal - Mala higiene genital. - DM mal controlada. - Ropa ajustada. - Cambio de pareja sexual.	- Lavado vaginal - Cambio de pareja sexual. - Uso de anticoncep. orales. - Mala higiene genital. - Taberquismo.
Cuadro Clínico	- Olor a pescado - Asintomática 50% - Indolora - Flujo Blanco-grasoso - Prurito 	- Flujo grumoso (queso cottage). - Eritema - Fisuras - Disuria - Dispareunia. 	- Flujo Espumoso - Fétido 2. - Coen en fresa - ITS. 
Dx	- Clínico - Criterios de AMSEC - Criterios de HAY-100N.	- Clínico - Cultivo. → confirmatorio. - Frotis en seco. - Tinción de gram. - Est. citológico cervico-vaginal	- Clínico. - Frotis en seco. - Especuloscopia.
Tx	- Miconazol Tab. 500mg VO q/12 hrs x 7-10 días.	- Miconazol 2% TOPIC. 2 aplicación (sg) en vulva y vagina al día x 7d. - Nistatina ovulos o tab.v. de 100 000 U. una aplicación/día x 14d. - Fluconazol cap. 150mg o 110mg	- Miconazol Tab 500mg VO q/12 hrs x 7-10 días.

Bibliografía:

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). (2010). Diagnóstico y tratamiento de las infecciones vaginales (candidiasis, tricomoniasis y vaginosis bacteriana) en mujeres en edad fértil. Secretaría de Salud. <https://>