Universidad del Sureste

Medicina Humana

Campus Comitán

Nombre de la alumna:

- Rosario Lara Vega

Trabajo: Cuadro comparativo de Cervicovaginitis

Grado y Grupo: 7° “A”

Nombre Del Docente: Dra. Fernández Solís Citlalli Berenice

Nombre de la materia: Clínica de Ginecología y Obstetricia

Cervicovaginitis

	Vaginosis bacteriana	Candidiasis	Trichomonas
Definición	Desequilibrio de la microbiota vaginal, su agente causal es Gardnerella vaginalis	Infección por levaduras, principalmente candida albicans.	Infección protozoaria por trichomonas vaginalis. (ITS)
Cuadro Clínico	• Flujo grisáceo • Olor a pescado • Sin prurito	• Queso cottage (flujo grumoso) • Prurito • Disuria • Dispareunia	• Flujo amarillo-verdoso • Espumoso • Fétido • Eritema cervical "fresa"
Factores de riesgo	• Ducha vaginal • tabaquismo • Anticonceptivos orales y DIU	• Obesidad • Embarazo • DM • ATB	• Multiples parejas sexuales
Diagnóstico	Clínico criterios de amsel criterios de Hay-Ison	Clínico • Fresh cultivo Tinción gram	Clínico Fresh en fresco Especuloscopia
Tratamiento	Metronidazol 500mg VO c/12h x 5-7 días	Fluconazol 150mg VO unica dosis	Metronidazol 500mg VO c/12hrs x 5-7 días

Bibliografía:

Workowski KA, et al. "Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021." *MMWR Recomm Rep*. 2021.