

**Universidad del Sureste  
Campus Comitán  
MEDICINA HUMANA**

**Alumno:**

Esthephany Michelle Rodriguez López

**Materia:**

**CLINICA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

**Grado: 7 Grupo: A**

**Comitán de Domínguez a 26 de mayo del 2025**

# Cuadro Comparativo — • —

	V. BACTERIANA	CANDIDIASIS	TRICHOMONAS
<b>DEFINICIÓN</b>	Desequilibrio de la microbiota vaginal con disminución de lactobacilos y proliferación de bacterias anaerobias	Infección causada por el crecimiento excesivo de hongos del género <i>Candida</i> , especialmente <i>albicans</i> .	Infección de transmisión sexual provocada por el protozoo <i>Trichomonas vaginalis</i>
<b>CUADRO CLÍNICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Olor a pescado</li> <li>◦ Flujo blanco/grisáceo</li> <li>◦ 50% asintomática</li> <li>◦ Prurito y ardor leve</li> <li>◦ pH &gt; 4.5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Flujo blanco, espeso y grumoso tipo "queso cottage"</li> <li>◦ Prurito intenso</li> <li>◦ Eritema</li> <li>◦ pH &lt; 4.5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Flujo amarillo-verdoso</li> <li>◦ Espumoso y maloliente</li> <li>◦ Prurito</li> <li>◦ Disuria</li> <li>◦ Dispareunia</li> <li>◦ pH &gt; 5</li> </ul>
<b>Rx RIESGO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Múltiples parejas sexuales</li> <li>◦ Uso de duchas vaginales</li> <li>◦ Dispositivos intrauterinos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diabetes descontrolada</li> <li>✓ Uso de anticonceptivo</li> <li>✓ Obesidad</li> <li>✓ Embarazo</li> <li>✓ Inmunosupresión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Relaciones sexuales sin protección</li> <li>◦ Múltiples parejas sexuales</li> <li>◦ Coinfección con otras ITS</li> </ul>
<b>DIAGNOSTIC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Clínico</li> <li>✓ Criterios de Amsel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Clínico</li> <li>✓ Cultivo</li> <li>✓ Microscopia con KOH 10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Clínica</li> <li>✓ Frotis en fresco</li> <li>✓ Pruebas de amplificación</li> </ul>
<b>TRATAMIENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Metronidazol tabletas 500mg VO cada 12 hr por 7 días</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Miconazol crema 2% por 3-7 días</li> <li>* Fluconazol tabletas 150mg VO dosis única</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metronidazol tabletas 500mg VO cada 12 hr por 7-10 días</li> <li>* Tratar a la pareja sexual</li> </ul>

Claro o blanco flocular, no homogéneo



Blanco, **grumoso**, en agregados adherentes ("requesón")



Amarillo verdoso, homogéneo, poco viscoso, **espumoso** (burbujas)



## REFERENCIAS

Hoffman, B., Schorge, J. et al (2021). Williams Ginecología (4.<sup>a</sup> ed.).  
McGraw-Hill Education

Organización Mundial de la Salud. (2016). Guías para el tratamiento de las  
infecciones de transmisión sexual. OMS.

Gilbert, G. (2020). Infectious Diseases in Women. Cambridge University  
Press