

Cuadro Comparativo/ Vaginosis Bacteriana, Candidiasis Vaginal, Tricomoniasis Vaginal

Sergio Fabian Trejo Ruiz

7° A

bibliografia:

Instituto Mexicano del Seguro Social. (2009). Guía de práctica clínica:
Diagnóstico y tratamiento de vaginitis infecciosa en mujeres en edad
reproductiva en primer nivel de atención (ISBN 978-607-8270-19-4).
https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/081GRR_1.pdf

Definición

Vaginitis bacteriana: Se caracteriza Por una o más signs y síntomas: Aumento de Flujo, Prurito, ardor, Irritación, Disuria, Dispareunia y Fétido o Mal olor vaginal.

Clinica

80% asintomática, Flujo o leucorrea vaginal fluida blanca o grisácea, Fétido, Olor a Pescado Sin dolor, Comezón, Prurito, Irritación.



Candidiasis vaginal: Es una infección del Epitelio Estratificado de la Vagina y el Vestíbulo Ocasionado Por levaduras oportunistas del genero Candida

Inflamación Vulva vaginal, Furas, Secreción adherente a la mucosa, blanquecino con grumos (queso Cottage). Estira o enrojecimiento, Pruriginoso, Males al coitar.



Tricomonas: Se considera mujer con alto riesgo si presenta: ≤ 25 años de edad con múltiples Parejas Sexuales Por más de 1 año. o Relaciones Sexuales sin Protección.

Flujo blanco o Amarillo, Espumoso, Eritema de Vulvas de rojo, Aspecto en fresa 10-50% Asintomática, Prurito, Disuria.



Factores de Riesgo

Lavado vaginal Raza Negra, Cambio de Pareja Sexual, Tabaquismo, Anticonceptivos hormonales, ITS.

Diabetes descontrolada uso de Anticonceptivos orales. Obesidad, uso de corticosteroides Quimioterapia Px: inmunosupresivos.

Múltiples Parejas. Relaciones Sexuales sin Protección.

Diagnostico

Clinico. Flujo o leucorrea blanca o gris, Fétido y olor a Pescado, Ausencia de Dolor, Comezón, Prurito, Irritación. - Criterios de Amsel - Criterios de HAY-ISON.

Frotis en fresco - Levaduras Pseudohifas. Tinción Gram. Estudio Citológico cervico-vaginal Confirmatorio: Cultivo.

Frotis en fresco, Citología cervical Cultivo de Secreción vaginal

Vaginitis Bacteriana Tratamiento: Metronidazol 100-500mg VO q/12h Por 5-7 Dias.

- Metronidazol 2g VO Dosis unica
- Metronidazol local vaginal Por 5 dias
- Alternativo: Tinidazol, o clindamicina 2g Dosis unica.

Candidiasis Vaginal Tratamiento: - Miconazol Crema 2%. Aplicar 5granos. / 7 dias

- Nistatina ovulas o Tabs 100,000 U, C/24h Por 14 Dias.
- Tx Oral: Fluconazol 150mg capsulas Dosis unica.

Tricomonas Tratamiento: Metronidazol oral 500mg C/12h Por 7 dias

Tinidazol 2g Dosis unica

o Metronidazol 2g Dosis unica