



Hellen Gissele Camposeco Pinto.

Dra. Citlali Berenice Fernández Solís.


PASIÓN POR EDUCAR

Cuadro comparativo
Clínica de ginecología y obstetricia

7“A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 27 de mayo 2025

CERVICOVAGINITIS

	Vaginosis Bacteriana	Candidiasis Vaginal	Tricomoniasis Vaginal
Definición	Sucede cuando se produce un desequilibrio en los niveles naturales de bacterias. - + Común en personas sexualmente activas.	Infección causada por el crecimiento excesivo de <i>Candida albicans</i> , hongo que normalmente vive en la vagina.	Es una infección de transmisión sexual, causada por <i>Trichomonas vaginalis</i> , realizar estudio sobre salud sexual. - Evitar relaciones sexuales.
Cuadro Clínico	- 50% asintomática - Leucorrea vaginal blanca - Fétido - olor a pescado - SIN dolor, comezón o irritación. 	- Inflamación vulvovaginal - Fiebre - Secreción blanquecina con grumos (queso cottage) - Eritema - Molestia al orinar. 	- Leucorrea amarillenta, espumosa - Fétido - Disuria - Cuello uterino en fresa - Dispareunia - ITS 
Factores de Riesgo	- Lavado vaginal - Raza negra - Anticonceptivos - Cambio de pareja sexual - Tabaquismo - ITS	- Diabetes descontrolada - Anticonceptivos orales - Obesidad - Uso de corticoides - Quimioterapia - Paciente inmunocomprometido.	- Actividad sexual sin protección. - Múltiples parejas sexuales. - Edad - Falta de acceso a la atención médica. - Mala higiene.
Diagnóstico	Criterios AMSEL - Flujo - pH > 4.5 - Rot 10% positivo - Gel medusas gran cantidad Criterios HAY-ISON - I Normal - Lactobacillus - II Intermedio - Flora mixta - III Vaginosis bacteriana - Gardnerella	- Frotes en fresco - levaduras - Tinción gram - Estudio citológico cervico vaginal - Confirmatorio - Cultivo. 	- Frotes en fresco. - pH vaginal > 4.5 - Cultivo de Diamond's - Especulos copia.
Tratamiento	1. Metronidazol 400-500 mg 2 veces/día - 5-7 días 2. Metronidazol local vaginal 5 días - Tx alt: Tinidazol o clindamicina simple (2gc DV)	Tópico 1. Miconazol crema 2%, una aplicación (5g) - Ora - Fluconazol caps 150 mg DV	1. Metronidazol oral 500mg 2 veces al día - 7 días. 2. Metronidazol oral 2gc DV - Alternativo - Tinidazol 2gc DV

Cita Bibliográfica

-Guía de práctica clínica (2009) Diagnóstico y tratamiento de la vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva en primer nivel de atención.