



Nombre del Alumno: Angel Yahir Olán Ramos.

Parcial : 3o

Nombre de la Materia: Clínica de ginecología y obstetricia.

Nombre del profesor: Citlali Berenice Fernández Solís.

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

7mo semestre

Criterio	Vaginosis bacteriana	Candidiasis vaginal	Tricomoniasis vaginal
Definición	Desequilibrio de la flora vaginal, con la disminución de lactobacilos y proliferación de bacterias anaerobias como <i>Gardnerella vaginalis</i> .	Infección por crecimiento excesivo del hongo <i>Candida albicans</i> en la vagina.	Infección de transmisión sexual causada por el protozoo <i>Trichomonas vaginalis</i> .
Cuadro clínico	Flujo vaginal denso, grisáceo o blanco, con olor a pescado; prurito y ardor vaginal ocasionales.	Flujo espeso, blanco y suave (tipo requesón); prurito intenso, ardor, enrojecimiento e irritación vulvovaginal.	Flujo espumoso, amarillo verdoso, con mal olor; prurito, ardor al orinar (dispareunia); puede ser asintomática.
Factores de riesgo	Múltiples o nuevas parejas sexuales, duchas vaginales, uso de antibióticos, tabaquismo.	Uso reciente de antibióticos, diabetes no controlada, embarazo, inmunosupresión, ropa ajustada o sintética.	Relaciones sexuales sin protección, múltiples parejas sexuales, antecedentes de otras ITS.
Diagnóstico	Criterios de Amsel: 3 de 4: olor a aminas, pH vaginal >4.5 .	KOH: pseudohifas, cultivos, examen pélvico, pH vaginal normal (4.0-4.5).	Microscopía fresca, NAA, cultivo. Observar tricomonas móviles.
Tratamiento	Metronidazol VO o gel vaginal.	Furazolidon VO o anti-fúngicos tópicos.	Metronidazol VO; tratar a la pareja.